



19 fasc. 1. vol. 104 pt. 1. col.

Bibliothèque botanique

ÉMILE BURNAT

Catalogue N° 425


Provient de la bibliothèque de
Louis Lerescure + 1885.

QK281

.R58

fasc. 1-7

c.2



I. F. Popken.

Fuer. 1838.

**DUPPLICATA DE LA BIBLIOTHÈQUE
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE GENEVE
VENDU EN 1922**



FLORA EUROPAEA

INCHOATA

A

JOH. JAC. ROEMER

MED. ET CHIR. DOCT.

EORVNDEMQUE IN INSTITVTO MEDICO - CHI-
RURGICO QVOD TVRICI FLORET,
PROFESSORE.

SOCIETATIS MED. ET CHIR. PER HELVETIAM CORRE-
SPONDENTIVM E MEMBRIS PRAESIDI ADIVNCTIS. SOC.
PHYSICAE TVRICENS. MEMBR. ORDINARIO. ACAD. REG.
SCIENT. STOCKHOLMIENS. NATVRAE SCRVTATOR. BERO-
LINENS. HALLENS. ET IENENS. AGRARIAE VICENTINAE,
PRIVATAE GOETTINGENS. MEMBRO HONO-
RARIO.

PRINTED
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

FASCICVLVS I.

NORIMBERGAE
EX OFFICINA RASPEANA
1797.

+QK281

.R58

fasc. 1-7

c. 2

1923
1923
1923
1923
1923
1923

ANTONIO LAURENT. JUSSIEU

INDEFESSO RERVM NATVRALIVM
SCRVTATORI

BOTANICO ILLVSTRI
MERITISSIMO

PRIMVM FASCICVLVM

SAGRVM ESSE VOLUIT

JO. JAC. ROEMER.

61167 - 1923

ЖИДКИЙ ОКСИД


ГЕРМАНИЯ

ПРОДАЮЩИЙ ПОВЫШЕННОЙ

ЧИСТОСТИ

СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗОК

СОДЕРЖАНИЯ



Soldanella alpina

Louisa Homer per.



SOLDANELLA ALPINA.

Alpendrattelblume. Soldanelle. Alpine Soldanella.

Pentandria Monogynia.

* *Fl. Monopetalii, inferi, angiospermi.*

CHAR. GEN. *Corolla campanulata, lacero - multifida.*
Calyx quinquepartitus, persistens. Capsula unilocularis, apice multidentato dehiscens.

SOLDANELLA *alpina*, floribus nutantibus; stylo corella excedente; foliis reniformibus sublobatis.

LINN. Hort. cliff. 49. Spec. Pl. p. 206. Syst. N. ed. XIV. p. 194. edit. GMEL. p. 328.

Habitat rarius in montanis, ubique in alpibus quæ nix nuper deliquescit

Helvetiae.

SCHEUCHZ. It. I. p. 50.

HALL. Hist. pl. Helv. n. 634.

Germaniae.

SCOP. Fl. Carn. edit. IIda. p. 135. n. 210.

IACQ. Vindob. 32. Fl. Austr. p. II. Tab. 13.

SCHRANCK Bai. Flora. n. 351. Primit. Fl. Salisb. n. 66.

REINER u. v. HOHENWARTH bot. Reisen. S. 14. 41.
SCHKUHR Handb. I. S. III. Tab. XXXIII.

Bohemiae

Fr. Wilib. SCHMIDT Fl. Bohem. Cent. II. p. 49.
n. 147.

Pannoniae

CLUS. Hist. p. 308 & 309.

Galliae

VILLARS Fl. Delph. II, p. 465.

LAMARCK Flore françoise. II. p. 254. n. 281.

Italiae

Monte Baldo descr. da G. PONA. p. 212, 214.

SEGUIER plant. Veron. I. p. 150.

ALLIONE Fl. Pedem. I. p. 89. n. 323.

PETAGNA inflit. Bot. II. p. 335. In ulter. Calabria.

Hispaniae

DEL ASSO in ROEMER Script. de pl. Hisp. &c. I.
p. 13. n. 35.

Floret Majo et Junio. Semina matura profert Augusto: Culta in Horto floret Majo, in hybernaculo aservata, Martio. 24

Radix perennis, lignosa, Folia emittens conferta, petiolata, reniformi-rotundata, firma, integerrima, aut ad marginem obsolete crenata, superne nitida, laete viridia, subius pallidiora et aliquando purpurascens. Petioli

tioli sesqui-biunciales, teretes, *Scapi* plures, teretes, glabri, aphylli, erecti, a duabus ad sex uncias longi, basi purpurascentes plerumque biflori, rarius biflori aut triflori. *Involucrum* tot foliorum linearium, crassorum, obtusorum, quot in umbella flores. *Flores* a duobus ad quatuor, inodori, nutantes, purpureo-caerulei, vel subinde dilute violacei. *Calyx* profunde quinquepartitus, persistens, viridis, lacinis linearibus obtusiusculis. *Corolla* campanulata, calyce triplo longior, e tubo brevissimo abiens in limbum quinquepartitum, ad medietatem ferme usque inaequaliter in numerosas lacinias lineares disiectum, *Stamina* quinque *Filamenta* brevissima, subulata, tubae corollae parti superiori infixa: *Antherae* sulphureae, in conum conniventes, lanceolato-ovatae, ad apicem appendiculatae; didymae, polline foetae luteo. *Germen* subrotundum intra petali tubum in fundo calycis haeret. *Stylus* filiformis, Corolla paulo longior, versus basin paululum incurvatus. *Stigma* simplicissimum. *Capulae* erectae, oblongo conicae, lineis intortis striatae, stylo post maturitatem deciduo coronatae, dehiscentes apice 5—10 dentato, uniloculares, placenta columnari, polyspermae. *Semina* fere rhomboidalia, obtusiuscula (ad 60.)

OBS. I. Color valde in hoc flore variat, vel in album abiisse CLUSIO, SCHEUCHZERO (*it. alp.* IV, p. 341.) et SEGUIERO visus.

OBS. II. Ad hanc speciem Casp. BAUHINUS in *Pinace* p. 295. et TOURNEFORTIUS in *Inst. R. H.* TILIUS in *Hort. Pisan.* p. 160. cum recentioribus fe-


re omnibus, vetulere SOLDANELLA minorem alpinam CLUSII *Hift.* p. 309., quam RAJUS in Stirp. exter. Cat. p. 239. ab ea separavit. Judicent ii, quibus est occasio utrusque promiscue crescentes observare.

OBS. III. Quam in J. MAYER's Samml. physik. Auff. Band. III. S. 302. cl. LINDACKER describit SOLDANELLA certe nihil aliud quam varietas nostrae est, in solo et situ pergrato luxurians.



Centaurea Caespitosa.

Louise Diner



CENTAUREA CAESPITOSA.

Syngenesia Polygamia frustranea.

CHAR. GEN. *Receptaculum* setosum. *Pappus* simplex.
Corollae radii infundibuliformes, longiores, ir-
 regulares.

CENTAUREA CAESPITOSA, calycibus palmato-spi-
 nosis, foliis sinuato-dentatis, inferioribus pe-
 tiolatis, superioribus semiamplexicaulibus.

LINN. S. N. ex edit. GMEL. p. 1268. n. 81.

Dom. CYRILLI Plant. Rar. Regn. Neap. Fas. I.
 Tab. VIII. p. 24.

An JACEA marina boetica Park. PLUKN. Tab. 94.
 f. 1. ?

*Habitat in Italia, in maritimis prope Neapolin,
 densissimos in arena formans caespites.* 24

Radices perennes lignosae, siccae, perpendiculares,
 extus nigrae, antiquissimos caespites componunt. E ra-
 dice immediate exeunt caules, ab ipsa basi in numero-
 sissimos ramos procumbentes et declinatos divisi. Cra-
 siuscui sunt, teretes, pubescentes, longitudinaliter stria-
 ti. *Folia* omnia sinuato-dentata, apice latiore denticu-
 lato, leviter pubescentia, dentibus omnibus mucronatis,
 non pungentibus. *Folia inferiora* petiolata, petiolis pla-
 nis uncialibus, ad basin purpurascensibus. *Folia superio-
 ra* sessilia semiamplexicaulia. *Flores* solitarii terminales.


Calyx ovatus, ferrugineus, spinosus, spinis palmatis, spinula intermedia longiore. *Corollae* disci et radii uniformiter purpureae. *Calycis* communis basin occupant folia quatuor vel sex inaequalia, concava, inflexa, irregulariter dentata, apice lanceolato-ovata. Haec *Involucris* vices gerunt. Corollarum odor tetrus, cyanoides.

OBS. Cent. *sonchifoliae* LINN. valde affinis. Ut Folia superiora non sunt decurrentia, nec repando-dentata, sed sinuato-dentata. Folia inferiora non sunt indivisa, lanceolato-dentata, sed omnia similem habent formam, exceptis foliis floralibus, sive supernis involucri formibus.



Trientalis europaea

Vogel sculp:



TRIENTALIS EUROPAEA.

Europaeisches Schirmkraut. Sternblümlein.

Common Trientalis, Chick - weed Winter-green.

Heptandria, Monogynia.

CHAR. GEN. *Calyx* heptaphyllus. *Corolla* heptapetal. *Bacca* sicca supera unilocularis. *Receptaculum* liberum. *Semina* depressa.

TRIENTALIS *europaea*, foliis lanceolatis, integerimis.

LINN. *Fl. Lapp.* ex edit. SMITHII. p. 109. *Fl. Suec.* p. 122. *Spec. plant.* p. 488. *Syst. Veg.* ed. XIV. p. 352. *edit. GMEL.* p. 595.

Habitat in nemoribus montosis humidis, in juniperis.

Germaniae

ROTH *Fl. Germ.* I. p. 164. I. 2. p. 431. cuius Synonymis adde :

ERHART *Beytr.* I. p. 97.

KÖLPIN *Suppl. Fl. Gryph.* p. 42.

SCHRANK *Bai. Flora.* I. p. 635. n. 586.

BAUMGARTEN *Fl. Lips.* p. 204. n. 527.
SCHKUHR *Handb.* I. S. 320. Tab. CII.

Silefiae

SCHWENKFELD *Cat. Stirp. Siles.* p. 117.
KROCKER *Fl. Siles.* T. I. p. 596. t. 53.

Bohemiae

SCHMIDT *Fl. Bohem.* Cent. IV. p. 72. n. 368.

Sueciae

LINN. *Fl. Suec.*
RETZ. *Prodr. Fl. Scand.* Edit. 2. p. 86.

Daniae

OED. *Fl. Dan.* Tab. 86.

Norvegiae

GUNNER *Fl. Norveg.* I. p. 80. n. 230.

Scotiae

LIGHTFOOT *Fl. Scot.* I. p. 194.

Angliae

HUDS. *Fl. Engl.* 160.
SOWERBY *Engl. Bot.* V. n. 15.

Poloniae

GILIBERT *Fl. Lithuan.* *inchoata.* in USTERI Delect.
II. p. 307. 8.

Semper terram pinguem humidam aut turfosam amat. Floret Junio et Julio; maturat semina Augusto. 4

Radix

Radix exigua, splendide candida, subnodosa, fibris teretibus, longis, albis. *Caulis* erectus, digitalis, palmaris, teres, simplex, aut a basi in duos aut tres caulinulos divisus, inferne albidus, superne viridis, glaber. *Folia* radicalia nulla: *caulina* alterna, integerima (obsolete ferrata — SCHRANCK), acutiuscula, in petiolum brevem decurrentia, laete viridia, glaberrima, plana, subtus nervo albido crasso percursa: inferiora remota obovata summa fastigiata caulem terminantia, raro obovata, faepe lanceolata, faepissime ovato-lanceolata in petiolum attenuata. *Pedunculus* unus alterve teres, gracilis, versus calycem rubellus, uniflorus longitudine foliorum, non e centro, sed ex axilla unius alteriusve folii exterioris asfurgens. *Flores* candidi, parvi, in stellam heptangularem expansi. *Calycis* foliola rubella linearia acutissima. *Petala* lanceolata, obtusa, candida, cum *filamentis* patentia. *Antherae* flavae, incurvatae. *Peric.* *Bacca* exsucca (theca globosa) membranacea, tenuissima, subdiaphana, sphaerica, unilocularis, evalvis. *Rec.* globosum, alveolatum, fungosum, maximum liberum. *Semina* pauca, circiter octo, subovata, depresso-ovalis, atra.

Variat I. Segmentis Calycis, Petalis, et Staminibus a quinque ad octo aut raro novem, plerumque sex.

2. Pedunculo solitario aut raro tribus.

OBS. I. Primus qui plantam descripsit, CORDUS in *Sylv. Obs. p. 222. a.* eam *Herba Trientalis* nomi-

nominavit. *Alsinanthemon variis* aucto^ribus
dicitur.

II. Singulare oblectamentum praebuit haecce stirps
Cel. à LINNE'. „Nescio, dicit in Fl. Lap-
ponica, „quaenam gratia floris adeo percellat
oculos, ut fere effascinare videatur visu con-
templatorem suum forte a symmetria, pulchri-
tudinis omnis matre!“ Forte, addo, quod
est fola species è classe Heptandria Lapponiae
indigena.



Dianthus deltoides



DIANTHUS DELTOIDES.

Feldnelke mit kleinen Kelchschuppen. Oeillet
deltoides. Maiden Pink.

Decandria Dignyia.

CHAR. GEN. *Calyx cylindricus*, monophyllus: basi
squamis quatuor. *Petala* 5 unguiculata. *Capsula*
cylindrica monolocularis.

DIANTHUS DELTOIDES (** *Flores solitarii*, plures in
eodem caule.) floribus solitariis: squamis calycinis
lanceolatis binis, corollis crenatis. LINN. S. Veg.
ed. XIV. p. 418. edit. GMEL. p. 711. Sp. pl. 588.
Hort. Cliff. 164.

*Habitat in pascuis et pratis aridioribus, imprimis
ad acervos formicarum.*

Germaniae

ROTH *Fl. Germ.* I. p. 187. II. I. p. 477. Cu-
jus Synonymis adde:

BAUMGARTEN *Fl. Lips.* p. 233. n. 591.

SCHRANK *Bai. Flora* I. S. 706. n. 672.

SCHKUHR *Handb.* I. S. 381. n. 1124.

BORKHAUSEN *Rhein. Mag.* I. S. 510. *Oberkatti-
sche Flora* I. S. 126.

CARYOPHYLLUS *deltoides* MOENCH *Method.* p. 57.

Pannoniae

Caryophyllus sylvestris septimus. CLUS. *Hist. plant.*
rar. p. 285. is plantam primus descripsit.

LUMNITZER *Fl. Posoniens.* p. 175. n. 416.

Galliae

VILLARS *Fl. Delphinat.* Tom. III. p. 598.

DIANTHUS *supinus.* LAMARCK *Fl. franç.* II. p. 534.
Sue-

Sueciae

LINN. *Fl. Suec.* edit. 2. p. 146. n. 382.

RETZII *Prodr. Fl. Scand.* ed. 2. p. 105. n. 532.

Daniae

Fl. Dan. Tab. 577.

Norvegiae

GUNNER *Fl. Norveg.* II. p. 139. n. 1070.

Angliae

HUDS. *Fl. Angl.* p. 184.

WITHERING'S *Bot. Arrang.* p. 441.

RELHAN *Cantabr.* p. 167.

AIT. *Hort. Kew.* II. p. 89.

Scotiae

LIGHTFOOT *Fl. Scot.* I. p. 225.

Poloniae

GILIBERT *Fl. Lithuan.* *inchoata* in USTERI *Delect.*
II. p. 276.

*Floret Junio ad Augusto. Semina dat matura sub
finem Septembbris. Hic illic in hortis colitur.* 24

*Caules digitales, palmates, subdecumbentes, superne
ramosi, dichotomi, geniculati, subpubescentes. Folia li-
nearia, subulata: radicalia in cespitem congesta; caulina
opposita, connato sessilia, internodiis breviora. Flos uni-
cus, longe pedunculatus, purpurascens, caulem ramosque
terminat. Bracteae duae, oppositae, ovato-lanceolatae,
calycis tubo duplo breviores. Cor. petala rubra, crenata,
ad basin laminae albis punctis variegata, e quibus prodeunt
setulae albae. Styli spiraliter convoluti, uno latere hir-
futi. Filamenta violacea.*

OBS. Variat subinde squamis calycinis quatuor, alternis
brevioribus.

Petalorum color mire variat, sed semper centrum
floris versus adest circulus e punctis saturatius rubris
constans.



Campanula hederacea.



CAMPANULA HEDERACEA.

Epheublättrige Glockenblume. Campanule lier-rée. Ivy - leaved Bell - flower.

CHAR. GEN. *Corolla campanulata. Stamina quinque, basi latiori conniventia. Stigma 3 — 5 fidum. Capsula infera, trigona, evalvis, trilocularis, foraminibus lateralibus dehiscens.*

CAMPANULA hederacea (***Capulis obtectis calycis sinibus reflexis*) foliis cordatis quinquelobis petiolatis glabris, caule laxo.

LINN. *Sp. pl.* p. 240. *Syst. V.* ed. XIV. p. 210.
Syst. ex. edit. GMEL. p. 351. n. 56.

C. *Cymbalariae vel Hederae folio.* C. BAUH. *pin.*
93. *Prodr.* 84.

C. *Cymbalariae foliis, vel folio hederaceo.* TOUR-
NEF. 112.

RAII *Hist.* 741, 17. BAUH. *hist.* II. 797.

PLUKNET *phyt.* t. 23. f. 1. Sed veterum auctorum icones hujus stirpis corollam male repræ-fentant.

LAMARCK *Encycl. Meth.* I. 2. p. 571.

Habitat in umbrosis humidis

Germaniae.

ROTH *Beyträge zur Botanic Th. I. S. 15. Fl. germ. I. p. 101. II, I. p. 260.*

CAMPANULAE *rotundifoliae* cel. SCHRANK in *Bai. Fl. I. S. 476.* varietas E huc quoque pertinere videtur.

Galliae

LAMARCK *Fl. franc. III. p. 338.*

Lusitaniae

VANDELLI *Fl. lusit. spec. p. II. in Roemer Script. de plant. hisp. p. 84.*

Hispaniae

CAMPANULA foliis subrotundis quinquangularibus,
basi-emarginatis, glabris, floribus solitariis. LOEFFL. *It. 127.*

Angliae

C. *Cymbalariae foliis RAI Synops. 277.*

HUDS. *Fl. Angl. 97.*

WITHERING's *Bot. Arrang. 220.*

DICKSON'S *Dried plants, 56.*

SOWERBY *engl. Bot. XXV. 73.*

Daniae

OEDER *Fl. Dan. t. 330. icon pessima.*

Floret Majo - Augustum. 24. In Hortiscoli potest, ad exemplum Horti Kewensis, ubi inter Kalmias pulcherrimas optime viget.

Radix

Radix perennis, (annuam praedicat amiciss. ROTH) fibrosa, tenuis, emittens *Caules* ut plurimum procumbentes, varie intricatos, teretes, glabros, ramosos. *Folia* alterna, subrotunda quinquangula, breviter petiolata, basi emarginata, angulis acuminatis. *Flores* terminales folitarii, longe pedunculati, subcernui, decidui. Segmenta *Calycis* acuminata integerrima.

OBS. Cel. LINNAEUS hanc stirpem plantam hybridam, quippe quae a Campanula aliqua et Veronica *herdifolia* ortum trahat, esse credit, aliena enim, dicit, a suo genere habere folia: sed folia hujus Campanulae certe majorem habent affinitatem cum *C. rotundifoliae* foliis radicalibus, quam cum dictae Veronicae.





Hypericum elodes

HYPERICUM ELODES.

Haarichtes Johanniskraut. Millepertuis cotonneux. Marsh St. John's Wort.

Polyadelphia polyandria.

CHAR. GEN. *Calyx* quinquephyllus *Corolla* pentapetal. *Capula* pyramidata trivalvis. Dissepimenta duplicata ex inflexis valvularum marginibus: loculis polyspermis.

HYPERICUM elodes (** Trigyna) floribus trigynis, caule tereti repente foliisque villosis subrotundis.

LINN. *Sp. pl.* p. 1106. *Syst. Veg.* ed. XIV. p. 702.
S. N. *ex edit.* GMEL. p. 1159. n. 40.

Ascyrum supinum villosum palustre. C. BAUH. *pin.* 280.

Ascyrum supinum elodes. CLUS. *Hist. App. alt.*
CARYOPHYLLUS palustris, foliis subrotundis incanis,
floribus aureis.

CHR. MENZELII *pug. plant. rar.* Tab. VII. f. 3,
Figura omnino bona.

ALTON *Hort. Kew.* III. 108.

Habitat in paludosis

Germaniae

H. humifusum, villosum, floribus lateralibus trigynis pedunculis nudis. MOEHRING (qui

primus in Germania plantam observavit)
Nov. Act. A. N. C. Vol. VII. p. 405.

ZHRHART Beytr. II. S. 161, 162.

ROTH Tent. Fl. Germ. II, 2. p. 232.

BORKHAUSEN in ROEMER'S n. bot. Mag. I. S. 10,
II.

Galliae

DALIBARD *Paris.* 234.

de NECKER *Delic. Gall. Belg.* II. p. 319.

LA MARCK *Fl. Franc.* III. p. 152.

Angliae

ASCYRON supinum villosum palustre. RAI Syn.
344.

HUDSON *Fl. Engl. ed. 2.* p. 334.

RELHAN *Fl. Cantabr.* p. 289. n. 557.

WITHERING *Bot. Arrang.* 815.

SOWERBY *Engl. Bot.* XXXI. p. 109.


Floret Augusto et Septembri. 24

Radix fibrosa, repens, perennis. *Caulis* inferne
repens, et ad genicula radices emittens, tunc adscendens,
erectiusculus, teres, subvillosum. *Rami* oppositi. *Folia*
opposita, approximata, sessilia, cordato - subrotunda ve-
lovata, integriflora, subvillosa, 5 — 7 nervia, punctis
pellucidis minutissimis notata. *Flores* laterales et termi-
nales, in paniculam dichotomam, paucifloram dispositi,
pedunculati, aureo - lutei, raro expansi, sed involuto-
contorti. *Calyx* pentaphyllus, foliolis ellipticis, quin-
que-

quenerviis, ferrato - glandulosis. *Petala* quinque, linea-
ria, calyce longiora. *Stamina* novem ad duodecim, in
tres phalanges connata. *Germen* ovatum. *Styli* tres,
filiformes persistentes. *Stigmata* simplicia. Ad basin ger-
minis glandulae nectariferae tres, parvae, luteae. *Cap-*
fula ovata, trilocularis, trivalvis. *Semina* plurima, el-
liptica.

OBS. Omnino quidem, uti jam b. LINNAEUS animad-
vertit, valde affinis est haec species *H. tomento-*
fo. At *H. tomentosum* differt ab *elode*, foliis
oblongiis, quorum nervi non e basi foliorum,
sed e nervo medio oriuntur; panicula multo majo-
ri et plus composita, calyce et staminibus profun-
dius divisus, glandulis tandem nigris vel purpu-
reis.





Cypripedium bulbosum.



CYPRIPEDIUM BULBOSUM.

Knolliger Frauenschuh. Bulbous Ladies-Slipper.

Gynandria Diandria.

CHAR. GEN. *Nectarium inflato - ventricosum.*

CYPRIPEDIUM *bulbosum*, flore pentapetalo, nectarii labio superiore ovali indiviso stylo adnato genitalia vix superante. Ed. SMITH Spic. Bot. I. p. 10. Tab. XI.

C. bulbosum LINN. Sp. pl. 1347. S. Veg. ed. XIV. p. 817. edit. GMEL. p. 62.

Fl. Suec. p. 319. n. 821. Att. Ups. 1740. p. 25.
Fl. Lapp. 319. t. XII. f. 5. Fl. Lapp. ex edit. SMITH p. 257. n. 319.

Calceolus mariae lapporum pusillus, flore ex flavo rubro variegato. RUDB. lapp. 96.

Orchis lappensis monofolia RUDB. elys. II. 209.
f. 10.

Orchis lapporum. RUDB. Hort. 81.

In LAPONIA legit Ill. Ol. RUDBECKIUS filius;
in RUSSIA S. BIELKE; (in SIBIRIA GMELIN (Sib. I. p. 7. t. II. f. 1.); in NOVA SCOTIA ad sinum Sancti Laurentii Archibaldus MENZIES. 24

Radix bulbosa, fibras paucas crassas e parte inferiore exferens, membranā semidiaphanā, acutā, erectā, bulbum longe superante tunicata. *Folium* radicale, folitarium, petiolatum, ovale, subacuminatum, integerimum, nervosum, atro virens, fusco maculatum, glabrum, Erythronii haud absimile. *Scapus* triuncialis, eratus, uniflorus, teres, vaginis duabus, membranaceis, tubulosis vestitus. *Braetea* solitaris, a flore paululum remota, linearis lanceolata, acuta, purpurascens. *Flos* subnutans. *Perianthium* nullum. *Petala* quinque, sursum spectantia, patentia, lanceolata, acuta, trinervia, purpurea, quorum tria exteriora. *Nectarii labium inferius* longitudine petalorum, maximum, inflatum, pendulum, purpureo-striatum, antice subtus acuminato-gibbosum, acumine bifido, superne hians, margine replicato, dilatato, dependente, fauce fasciculo villorum luteorum ornatum: *superius* petalis brevius, erectum, lato-ovale, pistillo arête adnatum, substantia et fere colore petalorum, integerrimum. *Pistillum* vix longitudine labii nectarii superioris, *Antheras* duas flavas paulo infra apicem gerens. *Stigma* vix conspicendum. *Germen* obconicum, inferum.

Descriptioni hujus stirpis cel. SMITH sequentia sub-jungit: — Rarissimam hanc inter Orchidæas Europæas plantulam primus memoravit Olaus RUDBECKIUS pater, in Catalogo Horti Upsaliensis, anno 1685. edito, sub nomine *Orchidis Lapponum*; quam postea etiam in Lapponia legit filius ejus præclarus, libelli, cui titulus Lapponia illustrata, auctor. LINNAEUS tamen, quamvis, ut verbis ejus utar, de hac planta valde sollicitus, num
quam

quam in itinere suo eam reperire potuit; attamen e figura a RUDBECKIO filio nitidissime depicta descriptionem confecit brevem, quam una cum icone aevi incisa illustrata, in Flora Lapponica evulgavit. Neque plantam ipsam, nisi post aliquot annos in Russia a cl. BIELKE lectam, et cum ipso communicatam, vidi. Jam inde botanicis rarissima et desideratissima, Europae arcticae propria, habita est, donec tria tantum exemplaria in nova Scotia anno 1786 viro indefesso Archibaldo MENTZIES sepe obtulerunt. Tandem alia plurima, ante quatuor circiter annos in Ostrobothnia prope Kemi lecta fuere, quorum unum dono mihi benevole dedit optimus et doctissimus vir Adam ASZELIUS tam egregie exsiccatum, ut colores ejus descriptioni Linnaeanae, ut et iconi a Cl. MENTZIES pictae, ad unguem responderent, unde figuram, vivam scilicet plantam videre non ausus sperare, adumbravi.





Saponaria luteola

SAPONARIA LUTEA.

Gelbes Seiffenkraut. Savonaire jaune. Yellow
Alpine Soapwort.

Decandria Dignynia.

CHAR. GEN. *Calyx* monophyllus, basi nudus. *Peta-*
ta 5, unguiculata. *Capula* oblonga, unilocularis.

SAPONARIA lutea calycibus teretibus cauleque hirtis,
petalis obovatis integerrimis, floribus corymbo-
sis, foliis linear-lanceolatis canaliculatis.

SMITH *Spic. Bot.* I. p. 4, 5. *Tab. V.* *S. lutea* LINN.
Sp. pl. 585. *Syst. Veg.* ed. XIV. p. 417.
edit. GMEL. p. 710.

Habitat in fissuris rupium

Montis TERNANCHE, Valeſiae finitimi
HALL. *Hift. ſt. Helv.* I. p. 394. n. 904. *

Montis CENISII

LYCHNIS floribus umbellatis ochroleucis, petalis
ovatis, filamentis nigris. ALLION. *Spec.*
Ped. 29. *Tab. V.* f. 2.

S. lutea ALLIONE *Fl. Ped.* II. n. 1560. *Tab. XXIII.*
f. I.

Floret mense Augusto. 2

Radix lignosa, tortuosa, ramosa, cespitosa. Cau-
les plurimi, debiles, erectiſculi, longitudine digiti, ge-
niciulati, articulis 3 vel 4, foliosi, teretes, pubefcentes.

Folia

Folia linear-lanceolata, obtusa, integerrima, canaliculata; *radicalia* congesta, marcescentia, glabra; *caulina opposita*, sessilia, fere connata, subhirsuta. *Corymbi terminales*, densi, multiflori. *Pedunculi* simplices trifidique, breves. *Braetiae* foliis similes, sed minores, oppositae ad basin peduncularum, hirsutae. *Calyx* cylindricus, quinque-dentatus, hirsutus, superne violaceus. *Petala* quinque, vix coronata, ungue violaceo, limbo obovato, integerrimo, luteo. *Stamina* 10, quorum 5 longitudine limbi, 5 breviora. *Filamenta* nigro-violacea, apice flavo. *Antherae* flavae. *Germen* in fundo calycis, ovale, parvum, viride, apice tuberculatum. *Styli* stamina longiora aequantes, albi, persistentes. *Stigmata* simplicia. *Capsula* ovalis, glabra, quadrivalvis, unilocularis. *Se-mina* plurima, reniformia, luteo-fusca, minutissime punctata.

OBS. Clariſſ. ALLIONI primus hanc plantam descripsit in opusculo supra citato, optimeque monuit eam distinctam esse a *Globularia lutea montana* COLUMNAE. LINNAEUS nihilosecius et HALLERUS utrasque conjunxerunt. Cl. SMITH in Herbario VAILLANTII tantas observavit differentias, ut plantam COLUMNAE pro nova specie sine ulla, ut ait, dubitatione, sub nomine SAPONARIAE *bellidifoliae* proponere ausus sit.

I N D E X
F A S C I C V L V S I.

- Soldanella alpina.* L.
Centaurea caespitosa. Cyr.
Trientalis europaea. L.
Dianthus deltoides. L.
Campanula hederacea. L.
Hypericum elodes. L.
Cypripedium bulbosum. L.
Saponaria lutea. L.
-



FLORA EUROPAEA

INCHOATA

A

JOH. IAC. ROEMER


MED. ET CHIR. DOCT.

EORVNDEMQUE IN INSTITVTO MEDICO - CHI-
RVGICO QVOD TURICI FLORET,
PROFESSORE.

SOCIETATIS MED. ET CHIR. PER HELVETIAM CORRE-
SPONDENTIVM E MEMBRIS PRAESIDI ADIVNCTIS. SOC.
PHYSICAE TVRICENS. MEMBR. ORDINARIO. ACAD. REG.
SCIENT. STOCKHOLMIENS. NATVRAE SCRVTATOR. BERO-
LINENS. HALLENS. ET IENENS. AGRARIAE VICENTINAE,
PRIVATAE GOETTINGENS. MEMBRO HONO-
RARIO.

FASCICVLVS II.

NORIMBERGAE
EX OFFICINA RASPEANA
1797.





Epimedium alpinum



EPIMEDIUM ALPINUM.

Alpen-Sockenblume, Bischoffsmütze. Epimède
des Alpes. Barren-wort.

Tetrandria Monogynia.

Flor. tetrapetali, inferi.

CHAR. GEN. *Nectaria* 4 cyathiformia, petalis in-
cumbentia. *Corolla* tetrapetala. *Calyx* cadu-
cus. *Capula* oblonga, bivalvis, polysperma.
EPIMEDIUM alpinum, foliis bi-triternatis cordato lan-
ceolatis, ciliatis: floribus laxe paniculatis.

LINN. *sp. pl.* I. 171. *Hort. cliff.* 37. *Hort. upf.*
29. *Syst. Veg.* ed. XIV. p. 159. edit.
GMEL. p. 256.

C. BAUH. *pin.* p. 323.

J. BAUH. *Hist. pl.* II. p. 391. f. 2. (descriptio bo-
na, sed figura ONONIDIS *spinosa*.)

MORISON II. f. 2. 8. 20. f. 5.

TOURNEFORT *Instit. r. herb.* 232.

Encyclop. Method. II, 1. p. 373.

AITON *Hort. Kew.* I. p. 157.

PETAGNAE *Instit. Bot.* II. p. 269.

BATSCHE *Analys. Fl.* I. p. 30 — 34. Tab. IV. f. 7.

MOENCH *Method.* p. 278, 79.

Habitat in umbrosis alpium.

Carniolicarum (circa Goriziam in sylva della Torre,
et in collibus sylvosis ad sinistram ejusdem syl-
vae; nec non in Sylva Sabattina, trans Lissone-
nium).

SCOP. *Fl. Carn.* I. p. III. n. 169.

Gallicarum (au mont Afrique, proche Dijon en Bourgogne).

LAMARCK *Fl. franç.* II. p. 523.

Italicarum





SEGUIER *pl. Veronens.* I. p. 399.

ALLIONE *Fl. pedem.* I. p. 238. n. 871.


Floret Aprili, Majo, Junio. 24 In hortis facile colitur.

Herba *caule* simplici, prope radicem *squamis* cincto, superne trichotomo foliato, subtus ad nodum florifero. *Folia* ex trichotomia 2 — 3 ternata divisuris villosis, pendula, cordato-lanceolata, ciliata, superne glabra, subtus glaucuscula. *Florum* panicula lateralis laxa, basi nuda, pauciflora, divisuris 1 — bracteolatis. *Calyx* 4 — phylloides, foliolis ovatis, coloratis, concavis, patulis, caducis. *Corolla* quadripetala, petalis navicularibus obtusis, calyce suo dimidio longioribus, purpurascenti-fulvis. *Nettaria*, totidem, quot petala, his incumbunt cucullata, calceiformia, sessilia, petalis breviora: margo singuli nectarii foliolo calycis breviori incumbentis, amplectit nectaria vicina. *Stamina* quatuor, *filamentis* brevibus, compressis, latiusculis, receptaculo affixis, *antheris* oblongo-ovatis. *Pistillum* irregulare, *germine* oblongo, sub-elongato, crassiusculo, postice magis compresso, carinato; *flylo* e summo germe lateral, breviore, utroque apice crassiusculo, excentrice imposito; *stigmate* simplici, luteolo, annulo rubro inferne fasciato. *Capsula* leguminiformis, oblonga, bivalvis, polysperma, feminibus oblique transversim sitis.

OBS. Habitat etiam in Japonia. V. THUNBERG *Fl. Jap.* p. 62.



Agaricus occipiens



AGARICUS DECIPIENS.

Der irreführende Blätterschwamm.

Cryptogamia, Fungi.

CHAR. GEN. *Fungus* subtilis lamellofus.

AGARICUS *decipiens* acaulis, adpresso, villosus, albus, lamellis interruptis, brevissimis, violaceis. WILLDENOW in ROEMER et USTERI *bot. Mag.* IV. S. 12, 13. *Tab. II. f. 5. a — d.*

α. Superficie externa alba lamellis minimis violaceis.

Fig. a.

β. Superf. ext. fordide alba, lamellis fuscescentibus.

Fig. b.

γ. S. ext. nigra, lamellis atro-fuscis. *Fig. c, d.*

δ. S. ext. nulla, lamellis atris.

HYDNUM *parasiticum* WILLD. *Fl. Berol.* n. 1179.

ECHINUS *nigricans*, squamis ellipticis, longissimis aculeis. HALL. *Helv.* n. 2318?

BOLETUS *dubius*, sessilis membranaceus, albo hirsutus; poris reticulato-diductis ochraceo-carneis. PLAN. *Suppl. Fl. Erf.* p. 27. n. 30?

H. *parasiticum* TIMM prodr. *Fl. Megap.* n. 1147. (fide sp. siccii).

A. *decipiens* HUMBOLDT Sp. *Fl. Friberg.* p. 74. n. 130.

H. *decipiens* SCHRADER *Spic. Fl. Germ.* I. p. 180, 181.

Habitat in Helvetiae et Germaniae (sine dubio et aliarum Europae regionum) Pinii cortice, et ad saepes paucim.

Stipes nullus. *Pileus* exacte refert laminam papyraceam vel coriaceam, est planus, irregularis, tenuis, explanatus, adpressus et lobatus. *Superficies externa* alba in junioribus est, et villosula, deinde color ille albus mutatur in virescentem, obscure album, fuscescem, et denique in nigrum. *Lamellae* sunt breves, a peripheria ad medium innumeris intervallis separatae, dentatae vel excisae, ut *Hydni* aruleis, praecipue si nigrae sint, haud dissimiles videantur. *Color* lamellarum est ruber, deinde fuscus, tandem vero niger. Vedit cl. WILLDENOW exemplaria lamellis eleganter violaceis, obscure violaceis, rufescentibus, fuscis, fusco-nigris, atrisque. Quo antiquior hic *Agaricus* est, eo longiores lamellae, ita ut *Hydnium* mentiantur.

OBS. A. *decipienti* proxime accedit BOLETUS obliquus (BOLTON *Hist. fung.* p. 76. t. 76. GMEL. *Syst. Nat.* II. p. 1438. n. 76.), quem DICKSON (*Fasc. pl. crypt. Britt.* I. p. 18.) cum B. *lacrymante* WULS. conjungit. Num vero H. *parasiticum* LINN., cui ab ill. GMELIN fungus noster adsociatur, revera huc pertineat, ob brevem descriptionem a Linnaeo datam, dijudicare nolle. Neque H. *parasiticum*, cuius HOUTTUYN, SCHRANK (Baj. *Flora* II. n. 1757.) aliquique plantarum Enumeratores mentionem faciunt, huc referri posse, cuilibet nostrum fungum cum descriptione et synonymis ab iis allatis conferenti, facile patebit. SCHRAD.



Funicus filiformis



JUNCUS FILIFORMIS.

Fadenförmige Binsen. Junc filiforme. Least soft Rush.

Hexandria Monogynia.

Fl. incompleti.

CHAR. GEN. *Calyx* diphyllus, *Corolla* hexapetala. *Capula* ovata vel trigona unilocularis, loculis monospermis; trilocularis, loculis polyspermis.

JUNCUS *filiformis* culmo nudo filiformi nutante, panicula laterali.

LINN. *Sp. pl.* p. 465. *Syst. Nat.* ed. XIV. p. 340.
edit. GMEL. p. 571. *Fl. Suec.* p. 112. n. 300. *Fl. lapp.* edit. SMITH p. 92. n. 118.

J. parvus, calamo supra paniculam compactam longius producto. PLURN. *Phyt.* t. XL, f. 8.

RUDB. *Elysf.* I. p. 104. f. 3.

J. laevis, panicula sparsa, minor. C. BAUH. *Pin.* 12. *Theatr.* 183. SCHEUCHZ. *Agrost.* 347. t. VII. f. 11.

J. *filiformis*, PETAGNA *Inst. Bot.* III. p. 652.

LAMARCK *Enc. meth.* III. p. 254.

Habitat in locis uliginosis, paludosis, turfosis et arenosis humidis

Helvetiae (in Gotthardi montis paludosis, inter Lau-
terbrunn et Grindelwald, in alpibus Sure-
nenibus. In monte Fouly, Sanetsch, su-
pra les Plans &c.)

J. J. SCHEUCHZER *It. alp.* I. p. 132.

J. caule-nudo, foliis mollibus, teretibus, panicula
laterali pauciflora. HALL. *Hist. Helv.* II.
168. n. 1313.

Germaniae.

ROTH *tent. Fl. Germ.* I, p. 154. II. I. p. 401.

Adde Synonymis ab amiciss. ROTH allatis:
SCHRANK *Bai. Fl.* I. S. 611. n. 554.

EAUMGARTEN *Fl. Lips.* p. 193. n. 501.

BORKHAUSEN *Rhein. Mag.* I. S. 555. n. 271. Ober-
katt. *Fl.* S. 173. n. 271.

MOENCH *Method.* p. 240.

SCHRADER *Spicileg.* I. p. 32.

Galliae

VILLARS *Hist. des pl. du Dauph.* II. p. 231.

LAMARCK *Fl. Franç.* III. p. 290.

Lusitaniae

VANDELLI *Fl. lusit. et Bras. spec.* p. 21. in ROE-
MER de plant. Hisp. p. 97.

Italiae

Italiae (in ascensu montis Cenisii, Italianam versus; etiam in monte Col de Balme prope Chamonix Sabaudiae, et in alpibus d'Ussel.)

ALLIONE *Fl. Pedem.* II. p. 215. n. 2075.

Daniae

O. FR. MÜLLER *Fl. Fridrichsdal.* p. 64. n. 294.

Sueciae

LINNAEI *Fl. Suec.* I. c.

RETZII *Prodr. Fl. Scand.* ed. 2. p. 79. n. 421.

LILIEBLAD *Uthast.* p. 123.

Norvegiae

GUNNER *Fl. Norweg.* II. p. 117. n. DCCCCXXXV.

Angliae

RAII *Syn.* 432.

HUDS. *Fl. Angl.* ed. 2. p. 149.

Scotiae

in monte Ben Lawers, Scotiae, ad lacum legit amiciss. DICKSON (*Dried Plants* n. 32.)

Floret Jun. et Julio. 24

Radix perennis, horizontalis, repens; squamis imbricatis striatis, glabris, fuscis tecta; *radiculae* filiformes, parum ramosae, pubescentes. *Culmi* fere pedales, erectiusculi, debiles, filiformes, striati, glabri; basi squamis oblongis, vaginantibus, striatis, fuscis, obtusis, saepe mucronulatis, vestiti; medium versus florigeri; apice magis

magis vel minus inflexi, mucronato - pungentes. *Folia* vix ulla, nisi culmi steriles pro foliis habendi sint. *Panicula* e medio culmi lateraliter erumpens, subcorymbosa, 5 — ad 8 — flora, albido - virescens. *Bractea communis* setacea, vix paniculam superans; *partiales* binae sub singulo flore, ovatae, concavae, membranaceae. *Pedunculi* plerumque simplices, uniflori, rarius biflori, triquetri, basi squamis aliquot vaginantibus instructi. *Calyx* foliola ovato - lanceolata, acuta, margine membranacea, dorso virescentia, striata, persistentia, tandem rufilescunt. *Stamine* calyce breviora. *Germen* parvum, subrotundum. *Stigmata* tria, pubescentia, persistentia. *Capsula* subrotunda, ferruginea, nitida, trivalvis, trilocularis; *dissepmimento* valvulis contrario. *Semina* numerosa, parva.



Holosteum umbellatum: L.

O. T. 1800. 10. 18.



HOLOSTEUM UMBELLATUM.

Doldentragende Spurre, Nelkengras. Morgeline ombellée. Umbel'd Holosteum.

Triandria Trigynia.

CHAR. GEN. *Calyx* pentaphyllus. *Corolla* pentapetalis, petalis dentatis. *Capula* subcylindracea, unilocularis, sexvalvis, apice dehiscens.

HOLOSTEUM *umbellatum*, floribus umbellatis. LINN.

Sp. Pl. 130. *S. Veg.* ed. XIV. 129.
ed. GMEL. p. 207.

CARYOPHYLLUS arvensis umbellatus, folio glabro, C. BAUH. *Pin.* 210.

CARYOPHYLLUS arvensis. J. BAUH. *Hist.* III.
p. 361. RAI^I *Hist.* II. 1028.

LYCHNIS graminea hirsuta umbellifera. MORIS.
Hist. II. p. 546. S. 5. t. 22. f. 46.

ALSINE verna, glabra, floribus umbellatis albis.
TOURNEF. 242.

H. umbellatum. AIT. *Hort. Kew.* I, 123.

GAERTNER *de fruct.* II. p. 231. *Tab.* 130.

Habi-

Habitat in agris, arvis argillofis, aggeribus, juxta vias montanas, et circa vineas

Helvetiae

ALSINE floribus umbellatis, petiolis ferratis. HALL.
Hist. Stirp. Helvet. I. p. 386, 87. n. 879.

Germaniae

ROTH *Fl. Germ.* I. p. 54. II, 1. p. 157. Cujus
 Synonymis adde:
 SCHRANCK *Bai. Fl.* I. S. 391. *Primit. Fl. Salisb.*
 p. 49. n. 130.
 SCHKUHR *Handb.* I. S. 64. Tab. XX.
 BORCKHAUSEN *Rhein. Mag.* I. S. 529. *Catzeneln-*
bog. Flora. S. 146.
 MOENCH *Method.* p. 226.
 MATTUSCHKA I. S. 83.
 KROCKER *Fl. Siles.* I. *Tab.* 31.

Hungariae

LUMNITZER *Fl. Poson.* p. 52. n. 127.

Galliae

DALIB. *Paris.* 134.
 VAILLANT *Bot. Paris.* p. 7. non autem icon Tab.
 III. f. 2.
 VILLARS *Hist. des pl. du Dauph.* III. p. 652.
 ALSINE umbellata. LAMARCK *Fl. franç.* III. p.
 45.

Hispa-

Hispaniae

LOEFFL. It. 120.

Italiae

SEGUIER Plant. Veron. I. p. 421.

ALLION. Fl. Pedem. II. p. 110. n. 1697.

PETAGNA Institut. Bot. II. p. 212.

Sueciae

RETZ. Prodr. Fl. Scand. Edit. 2. p. 29.

Angliae

CERASTIUM umbellatum. HUDES. Fl. Engl. 201.

ROSE'S Elements (Appendix) 445. t. 2. f. 4.

WITH. Bot. Arrang. 132.

Poloniae

GILIBERT Fl. Lithuan. inchoata, in USTERI Delect. II. p. 268.

Floret Aprili et Majo. ◎

Caulis teres, inferne glaber, superne pubescens, decumbens, ascendens, ramosus, digitalis et palmaris. *Folia* glabra, integerrima, succulenta: *radicalia* in cespitem congesta, in petiolum decurrentia, obverse lanceolata; *caulinis* opposita lanceolata, connato-amplexicaulia; *suprema* ovata, acutiuscula. *Pedunculi* sex s. septem in caule terminales, fasciculati, uniflori, floriferi erecti, fructiferi ad unum latus depresso. *Bracteae* ad basin peduncularum ovatae, exiguae. *Calyx* ovato-lanceola-

ceolatus. *Petala* parva, fere conniventia, extus subrubella dum immatura sunt, deinde alba, unguibus virentibus, obovata, obtusa, apice tridentata. *Stamina* plerumque quatuor. *Styli.* 4. *Capsula* unilocularis, sexvalvis, apice dehiscens, denticulis senis revolutis. *Receptaculum* columnare, liberum. *Semina* numerosa, convexa, angulata.

VARIAT *Petalis* bidentatis.

Staminibus tribus et quinque.

Stylis tribus.



Ophrys Locselii-

OPHRY'S LOESELII.

Loefel's Ragwurtz. Ophrys de Loefel. Dwarf Ophrys.

Gynandria Diandria.

CHAR. GEN. *Calyx* (Corolla LINN.) pentaphyllus, coloratus, irregularis: foliolis duobus exterioribus, tribusque interioribus. *Corolla* bilabiata; *Labium superius* brevissimum, duas antheras per filamenta brevissima cum stylo conjunctas recipiens tegensque, *inferius* magnum, planum, porrectum ecalcaratum. *Germen* inferum, contortum. *Capula* trivalvis, polysperma.

OPHRY'S *Loefelii* ** bulbo subrotundo, scapo nudo trigono, nectarii Labio ovato. LINN. Sp. pl. p. 1341. S. Veg. ed. XIV. p. 813. ed. GMEL. p. 57. n. 13. Fl. Suec. ed. 2. p. 316. n. 812.

Habitat in pratis paludosis et locis turfosis

Germaniae

LOESEL pruss. 180. t. 58.

In pratis paludosis prope Driburgum invenit stirpem rarissimam cel. Ehrhart, eandemque in Herbario sicco n. 110. amatoribus obtulit.

ROTH Fl. Germ. II, 2. p. 402, 3.

Bohemiae

Fr. W. SCHMIDT *Fl. Bohem. Cent. I.* p. 70. n.
LXXXII. (*O. lilifolia.*)

Galliae

VILLARS *Hist. des pl. du Dauph.* II. p. 47, 48.
(*O. lilif.*)

Sueciae

LINN. *Fl. Suec.*

RETZII *Prodr. Fl. Scand. Edit. 2.* p. 207. n.
1098.

Daniae

FL. DAN. *tab. 877.* (*O. paludosa.*)

Norvegiae

GUNNER. *Fl. Norveg.* II. p. 121. n. 962.

Angliae

Pseudoorchis bifolia palustris. RAI Syn. 382.

O. lilifolia RELHAN *Fl. Cantabrig.* p. 337. n. 655.

HUDS. *Fl. Engl.* 390. β.

WITH. *Bot. Arr.* 988.

SOWERBY's *engl. Bot.* XVI. 47.

Belgiae

DE GORTER *Fl. VII. Provinc.* p. 237. n. 736. (*O.
lilifolia.*)

varissima fere ubique, floret Julio. 24

*Bulbus rotundus albidus, tunicis diaphanis, siccis,
albidis vestitus; subtus radix transversa in terram conti-
nuata;*

nuata; supra in vaginam diaphanam siccām, flaccidam, basi turgidam elongatus, scapum et folia cingentem. *Folia* duo, in vaginam membranaceam basi desinentia et insuper vagina folii primordialis imperfecti, oblique apice retusū involuta, dentis vaginis uncialia et biuncialia, nervosa, tenuia, subdiaphana, isthmis intercepta et quasi reticulata, integerrima, glaberrima, scapo paulo breviora, magnitudine inaequalia, altero paulo breviore, latiore, obtusiore, fere ex oblongo ovali; altero longiore, paulo angustiore, lanceolato, acuminato. *Scapus* erectus, semidigitalis et digitalis, raro longior, nudus, glaber, infra medium in folierum vaginis laxis latitans, supra medium triqueter, terminatus racemo paucifloro. *Flores* quatuor, sex, ad octo, vix unquam plures, alterni, erectiusculi, parvi, tamen triplo faltem maiores quam in *O. Monorchide* et *paludosa*, albidi, s. ex viridi-flavescentes. *Calycis* folia patentia, viridi-flavescens; duo exteriora angustissima, linearia; interiora tria oblonga, obtusa. *Corollae* labium erectiusculum, ovatum, integerrimum, sursum cavum, subcrenulatum, flavum. *Germen* clavatum, versus basin attenuatum, post florescentiam magis incurvum. *Bractea* sub quovis flore minima lanceolata, membranacea, siccā, rigidiuscula. *Capula* ovata, obtusa, basi attenuata, glabra, erecta.

OBS. Affirmat cel. Ed. SMITH, fultus Herbarii Lineani fide, *O. lilifoliam* LINN. non nisi Americes esse indigenam, omniaque quae in variis LINNAEI operibus occurruunt Synonyma europaea OPHRYDIS *lilifoliae*, vere ad hanc *O. Locselii* pertinere. Quidquid sit, istud faltem negari non potest, magnam, sinon nimiam, affinitatem intercedere,

inter *O. lilifoliam* et *Loefelii* LINN. Neque hoc silentio prætereundum, cel. RETZIUM distincte *O. lilifoliam* et *Loefelii* LINN. utrasque Scandinaviae indigenas esse profiteri. Sed vereor, ne vir cel. utrasque potius ex auctoritate quam ex autopsia adduxerit.

OBS. II. Variat stirps nostra scapo trigono et pentagono.



Ophrys monorchis



OPHRYS MONORCHIS.

Einhodige Ragwurtz. Ophrys unibulbe. Musk
Orchis.

Gynandria Diandria.

OPHRYS ** *monorchis*, bulbo globoſo, ſcapo nudo; nectarii labio trifido cruciato. LINN. *Sp. pl.* p. 1342. *Syft. V.* p. 814, n. 14. *edit.* GMEL. pag. 57. n. 19.

Orchis odorata moschata, f. *Monorchis*. C. BAUH.
Pin. 84.

Monorchis montana minima, flore obſoleto, vix conspicuo. MICHELI *nov. gen.* p. 30. t. 26.

Herminium bulbo ſupra radiato, nectarii labio trifido. *Ait. Ups.* 1740. p. 29.

PETAGNAE *inflitut. bot.* IV. p. 1738. n. 14.
AIT. *Hort. Kew.* III. p. 300.

Habitat in pratis uliginofis, subalpinis et montanis

Helvetiae

HALL. *Hift. pl. Helv.* n. 1262. t. 22. *Enumerat.* 269. n. 20.

Germaniae

ROTH *tent. Fl. Germ.* I, p. 382. II, 2. p. 402.
Cujus Synonymis adde:

Orchis coleo unico, f. *Monorchis* floſculis pallide viridibus. LOES. *Fl. Pruff.* p. 184. t. 61.

HALL. *It. hercyn.* n. 6.

Monorchis bifolia, flore pallide virente, Prussica,
MENZEL. *pugill.* Tab. 5. f. 5.

ORCHIS *Monorchis* SCHRANK *Bai. Fl.* I. S. 236,
237.

FUNK *Beytr. z. Salzb. Flora*, in RÖMER's Archiv,
I., S. 40.

SCOPOLI *Fl. Carn.* II. p. 195. n. 1116.

Bohemiae

Fr. Wilib. SCHMIDT *Fl. Boem.* Cent. I. p. 72, 73.
n. LXXXV.

Hungariae

CLUS. *Pannon.* p. 239. (*Orchis pusilla alba odorata.*)

Galliae

VILLARS *Hist. des pt. du Dauphiné.* II. p. 48.
LAMARCK *Fl. Franç.* III. p. 513.

Italiae

SEGUIER *pl. Veron.* II. p. 131. n. 22. Tab. XVI.
n. 15. Icon prorsus aliena.

ALLIONE *Fl. Pedem.* II. p. 148. n. 1832. (OR-
CHIS *monorchis.*)

Bernh. ab UCRIA Hort. Reg. Panorm. p. 384. (*Si-
culis*: Orchidi cu radică tunna).

Belgii

DE GORTER *Fl. VII. Provinc.* p. 238. n. 737.

Daniae

Fl. Dan. tab. 102.

Sueciae

Sueciae

- LINN. *Fl. Suec.* p. 315. n. 810. *Fl. Lappon.*
edit. SMITH p. 256. n. 317. (HERMI-
NIUM radice globofa.)
RETZII *Prodr. Fl. Scand.* ed. 2. p. 207. n. 1101.
LILIEBLAD *Svensk Flora.* p. 214.

Norvegiae

- GUNNER *Fl. Norweg.* II. p. 72. n. 644.

Angliae

- RAII *Syn.* 378.
RELHAN *Fl. Cantabrig.* p. 338. n. 657.
HUDS. *Fl. Angl.* ed. 2. p. 390.
WITH. *Bot. Arr.* 990.
SOWERBY *engl. Bot.* XXIV, 71.

Floret Junio et Julio. 24

Radix bulbus unicus, globosus, nudus, solidus, albidus; supra fibrae radicales, simplices, teretes. *Scapus* strictus, palmaris, teres, nudus; interdum folio vaginanti solitario, vel *Squamis* nonnullis membranaceis exiguis ornatus. *Folia* radicalia duo aut tria, ovato-lanceolata, basi vaginantia. *Spica* densa, longa. *Bracteae* lanceolatae, acutae, germinibus breviores. *Flores* ex luteo vientes, oblique dispositi, nutantes, odori. *Calycis* foliola patula; duo lateralia interna basi denticulo notata, supernum ovatum, duo lateralia exteriora lanceolata. *Corollae* labium trifidum; laciinis lateralibus transversim in crucem positis, integris, obtusis; intermedia produccione, acuta. *Germen* erectum ad florem in pedicellum incurvum attenuatum.

OBS. Habitu OPHRYOS *paludosae* non dissimilis, sed tamen satis superque differt. 1. *Bulbo* unico, supra fibris coronato. 2. *Caule* tereti. 3. *Foliis* ad radicem duobus plerumque, lanceolatis, acuminatis, glabris, longioribus. 4. *Spica* breviore, deniore. 5. *Corollae labio* trifido, cruciformi; *laciniis* linearibus, angustissimis: nec integerimo, lingulato.

OBS. II. Apparenter tantum bulbum unicum habet haec species: ad apicem nempe unius alteriusve fibrae radicalis exoritur bulbis sequentis anni, qui autem post deflorescentiam solum bulbi adulti incrementa capere incipit.



Sagittaria sagittifolia

Neglectus Abg.

SAGITTARIA SAGITTIFOLIA.

Gemeines Pfeilkraut. Fléchière aquatique.

Common Arrow-head.

Monoecia Polyandria.

CHAR. GEN. *Masc.* *Calyx* triphyllus. *Corolla* tri-petala. *Filamenta* 24 - 30.

Fem. *Calyx* triphyllus. *Corolla* tripetala. *Pistilla* multa. *Capsulae* utriculares numero-simillimae semilunatae, compressae, monospermae. *Semen* teretiusculum, compressum.

SAGITTARIA *sagittifolia*, foliis sagittatis. LINN. Sp. pl. II. p. 1410. Fl. lapp. edit. SMITH. p. 279. n. 344. Fl. Suec. edit. 2. p. 340. n. 869. Hort. cliff. 447. Syst. Veg. ed. XIV. p. 856. edit. GMEL. p. 884.

C. BAUH. Pin. 194.

J. BAUH. Hist. III. p. 779 et 780. α .

Ranunculus *palustris* folio sagittato maximo, et R. p. f. f. *angustiori*. TOURNEF. inst. 292.

VAILLANT Att. Academ. Reg. Paris. A. 1719. I. p. 32.

PFTAGNA instit. Bot. V. p. 1828.

GAERTNER de fruct. II. p. 21. Tab. 84. f. 3.

AIT. Hort. Kew. III, p. 352.

Habitat passim in fossis, piscinis, fluviiis, lacubus argillofisis.

Helvetiae

HALL. *Hist. plant. Helv.* n. 1185.

Germaniae

ROTH *tent. Fl. Germ.* I. p. 406. II, 2. p. 480.

Cujus Synonymis adde:

SCHRANK *Bai. Fl.* II. n. 866.

BAUMGARTEN *Fl. Lips.* p. 303. n. 754.

BORKHAUSEN *Rhein. Mag.* I. S. 399. *Catzenelnb.*

Flora S. 9.

MOENCH *Method.* p. 219.

† †

SCOP. *Fl. Carn.* 2. T. II. p. 239. n. 1181.

† †

MATTUSCHKA *Fl. Siles.* n. 696.

Hungariae

LUMNITZER *Fl. Poson.* p. 434. n. 975.

Galliae

LA TOURRETTE *Chlor. Lugd.* 28.

VILLARS *Hist. des pl. du Dauph.* III. p. 756.

LAMARCK *Fl. franç.* II. p. 197.

Italiae

SEGUIER *Pl. Veron.* I. p. 365, 66.

ALLIONE *Fl. Pedem.* I. p. 235. n. 863.

Lusitaniae

VANDELLI *Fl. lusit. spec. in ROEMER script. plant.*
Hisp. &c. p. 151.

Belgii

MEESE *Fl. Friſ.* p. 60. n. 399.

DE GORTER *Fl. VII. Prov.* p. 257. n. 795.

Daniae

Daniae

O. FR. MÜLLER *Fl. Friedrichsdal.* p. 174. n. 782.
Fl. Dan. t. 172.

Sueciae

LINN. *Fl. Suec. et Läpp.*
 RETZII *Prodr. Fl. Scand.* ed. 2. p. 225. n. 1195.
 LILIEELAD *Svensk Flora.* p. 185.

Norvegiae

GUNNER *Fl. Norveg.* II. p. 110, n. 875.

Angliae

RAII *Syn.* 258.
 RELHAN *Cantab.* p. 362. n. 710.
 HUDSON *Fl. Engl.* ed. 2. p. 420.
 WITH. *Bot. Arr.* 1079.
 SOWERBY *engl. Bot.* XXVI, 84.
 SIBTHORP *Fl. Oxon.* p. 178. n. 509.

Floret Junio et Julio. 24

Radices, in America crassiores, Indis in cibum cedunt. Chinenses Sagittariam colunt, cuius radicibus vescuntur. Nobis fortassis ideo negliguntur, quia inest illis vis caustica et acris, instar Alismatis et Ranunculorum. Praeter oves etiam a pecore amantur.

Radix fit teretibus fibris innumerabilibus densis, in vaginosum caput convenientibus. *Scapus* simplex, angulosus, sulcatus, nudus, fere pedalis. *Folia* radicalia, in cespitem congesta, *petiolis* longis, erectis, triangularibus, medulla spongiosa infarctis; sagittata utrinque acuta, glabra, integerrima, plana, laciniis retrorsum divergentibus.

Flores

Flores masculi et foeminei in scapo verticillati, pedunculati, tripetali. *Verticilli* remoti, plerumque triflori. *Petala* subrotunda, alba, unguibus purpurascensibus. *Braeae* sub quovis pedicello ovata, membranacea, brevis, obtusa.

Variat Foliis latissimis, latioribus et *angustis*.

OBS. I. *Scapus* et *petioli*, rarissimo in plantis aquaticis exemplo, avulsi suecum lacteum fundunt.

OBS. II. Nonnunquam et 3 – 4 pistilla (nescio an fertilia) in floribus masculis obseruantur.

OBS. III. Folia juniora linearia, graminea, demum evadunt fagittata.



Lathyrus Nigfolia



LATHYRUS NISSOLIA.

Nissol's Platterbse. Geße nissole. Crimson
Grafs - vetch.

Diadelphia Decandria.

CHAR. GEN. *Perianthium* quinquefidum: laciniis duabus superioribus brevioribus. *Stylus* planus, supra villosus, superne latior.

LATHYRUS Nissolia, pedunculis unifloris, foliis simplicibus, stipulis subulatis. LINN. *Sp. pl.* p. 1029. n. 2. *Syst. Veg.* ed. XIV. p. 662. *edit.* GMEL. p. 1109. Lathyrus foliis solitariis lentiformibus. *Vir. cliff.* 74. *Hort. cliff.* 366.

Lathyrus sylvestris minor. C. BAUH. pin. p. 344.

Catananche leguminosa quorundam. Joh. BAUH. *Hist.* II. p. 309.

Nissolia vulgaris TOURNEF. 656.

Nissolia parva, flore purpureo. BUXB. *Cent.* 3. p. 84. t. 45. f. I.

L. *Nissolia PETAGNA infit.* *Bot.* IV. p. 1368.

LAMARCK *Encycl. method.* II, 2. p. 696.

AIT. *Hort. Kew.* III. p. 39.

*Habitat in agris, inter segetes
Helvetiae*

HALLER *Hist. stirp. Helv.* I. p. 190. n. 441.

Germaniae

RÖTH *Fl. germ.* I. p. 307. II. 2. p. 174. cuius Synonymis adde:

SCHKUHR *Handb.* II. S. 350. n. 3063.

† †

SCOPOLI *Fl. carn.* II. p. 61. n. 888.

Galliae

Lathyrus angustifolius erectus, folio singulari sine capitulo D. Nissolle. MAGNOL. *Hort. Reg. Monsp.* p. 112. c. ic.

VILLARS *Hist. des Plant. du Dauph.* III. p. 441.

LAMARCK *Fl. franç.* II. p. 572.

† †

DE NECKER *Delic. Gall. Belg.* II. p. 306.

Italiae

SEGUIER *pl. Veron.* II. p. 82. n. 4.

ALLIONE *Fl. Pedem.* I. p. 329. n. 1217.

Angliae

Catananche leguminosa quorumdam RAIH *Syn.* 325.

RELHAN *Cantabr.* p. 271. n. 519.

HUDSON *Fl. Engl.* p. 315.

WITHERING *Bot. Arr.* 770.

SOWERBY *engl. Bot.* XXXI, 112.

SIBTHORP *Fl. Oxon.* p. 222. n. 620.

Floret Junio et Julio. ♂.

Caulis simplex, erectus, pedalis et major, angulosus, glaber. *Folia* alterna, graminea, linearis acuminata, longa, integra, plana, amplexicaulia, nervosa. *Sipulae* lineares, subulatae. *Pedunculi* ex alis foliorum, solitarii, uniflori aut biflori. *Flos* nutans. *Calycis* segmenta triangularia, aristata, superne breviora, excisa. *Vexillum* miniatum, emarginatum, venosum. *Alae* minutae, ovatae, purpureae, hamo brevi. *Carina* rostro lato, additamento subcaeruleo, acuto, argute rostrato. *Legumina* glabra, praelonga, angusta, pendentia. (villoso, stylo recto terminata, scop.). Ad quindecim et viginti *semina* rotunda, compressa.


OBS. *Cirrhi* nulli, sed folia, simplicia, graminea, in quo differt ab omnibus congeneribus. Quaestio autem est, utrum illud, quod in hac planta folia nuncupamus, revera folia sint, an potius petioli communes nudi, dilatati, foliiformes?



I N D E X

F A S C I C V L V S II.

- Epimedium alpinum.* L.
Agaricus decipiens. Willd.
Juncus filiformis. L.
Holosteum umbellatum. L.
Ophrys Loefelii. L.
Ophrys Monorchis. L.
Sagittaria sagittifolia. L.
Lathyrus Nissolia. L.
-



F L O R A E U R O P A E A

I N C H O A T A

A

JOH. JAC. ROEMER


MED. ET CHIR. DOCT.

EORVNDEMQUE IN INSTITVTO MEDICO - CHI-
RVRGICO QVOD TVRICI FLORET,
PROFESSORE.

SOCIETATIS MED. ET CHIR. PER HELVETIAM CORRE-
SPONDENTIVM E MEMBRIS PRAESIDI ADIVNCTIS. SOC.
PHYSICAE TVRICENS. MEMBR. ORDINARIO. ACAD. REG.
SCIENT. STOCKHOLMIENS. NATVRAE SCRVTATOR. BERO-
LINENS. HALLENS. ET IENENS. AGRARIAE VICENTINÆ,
PRIVATAE GOETTINGENS. MEMERO HONO-
RARIO.

FASCICVLVS III.

NORIMBERGÆ
EX OFFICINA RASPEANA
1798.




ALBERTO GULIELMO
ROTH

MED. DOCT. PHYSICO PROVINCIALI DVCATVS
BREMENSIS. ACAD. CAES. NAT. CVR.
SOCIO CAET.

TERTIVM
FLORAE EUROPAEA FASCICVLVM
OBSERVANTER

D. D. D.

J. J. ROEMER.





Alyssum *sinuatum - L.*

Louise Römer pinxit:

G. Vogel sc.

ALYSSUM SINUATUM.

Ausgeschweiftes Steinkraut. Vesicaire sinuée.
Sinuated Mad-wort.

Tetradynamia siliculosa.

CHAR. GEN. *Silicula* compressa aut turgidula, subrotunda, aut ovata, leviter emarginata, stylo persistente coronata: loculis subdispermis. *Stamina*, duo breviora (in nonnullis) denticulata. *Corolla* regularis.

ALYSSUM *sinuatum*, caule herbaceo, foliis lanceolato-deltoidibus: siliculis inflatis. LINN. Spec. pl. II. p. 909. Syst. Veg. edit. XIV. p. 590. edit. GMEL. p. 977.

GOUAN H. R. Monsp. p. 321.

PETAGNA *inflit.* bot. IV. p. 1222.

AITON Hort. Kew. II. p. 382.

VITMAN Summ. plant. IV. p. 29.

GAERTNER de fruct. II. p. 283.

SCHKUHR Bot. Handb. II. S. 235. Tab. CLXXXI.

Leucoium incanum siliquis rotundis. C. BAUH. Pin. p. 201.

Alyssoides incanum, foliis sinuatis. TOURNEF. inflit. I. p. 218.

MORISON Hisp. II. p. 247. n. 6. f. 3. t. IX. f. 6.

Alysson siliquis inflatis, foliis tomentosis. HALL. Enum. pl. H. Goett. p. 241.

Alyssoides sinuatum. MEDICUS Pflanzengatt. I. S. 63. Tab. I. Fig 17.

Habi-

ALYSSUM SINUATUM.

Habitat in incultis et ad vias

Insulae Candie (caeterarumque Insularum Archipelagi)

*L' Eruca peregrina del Clusio, ò Leucoio marino
de' Padoani.*

PONA Monte Baldo (4. Venet. 1617.) p. 47.

Hispaniae

*Eruca peregrina. CLUS. Hisp. (8. Antv. 1576.)
p. 420.*


Floret Majo ad Julium. ♂.

Caulis pedalis, fesquipedalis, raro bipedalis, parum ramosus. *Folia*, praesertim quae radici proxima sunt, dentata, sinuata, incana, in petiolum abeuntia: *caulina summa* sublinearia. Tota planta levi tomento obducta, viridi - incana. *Flores* in summis caulis congesti, saturate lutei. *Calyx* foliola hirsuta, conniventia, duo deorsum gibba. *Petala* acute satis bifida, unguiculata, unguibus calycem aequantibus. *Stamina* sex: duo minora basi latiora (non vera denticulata.) *Silicula* magritudine pisiformis, subglobosa, inflata, glabra, viridi - albicans, bilocularis, bivalvis, stylo persistente acuminata; dissepimento rotundato tenuissimo, valvis parallelo. *Semina* rotunda, compressa, ut fere foliacea aut bracteata, fordiste rufescentia aut ferruginea, margine membranaceo albicante cincta, mucilaginosa.



Cortusa Matthioli. L.

cooper



CORTUSA MATTHIOLI.

Alpsanikel. Cortuse de Matthiele.

Pentandria Monogynia.

CHAR. GEN. *Calyx* quinquefidus. *Corolla* infundibuliformis; tubo sensim ampliato in limbum quinquefidum aequalem, fauce nuda. *Stamina* quinque antheris linearibus tubo corollae insidentibus. *Capitula* unilocularis, bivalvis. *Receptaculum* liberum. *Semina* plura: umbilico ventrali, e regione embryonis.

CORTUSA Matthioli calycibus corolla brevioribus. LINN.

Spec. pl. I. p. 206. *Syst. Veg.* edit. XIV. p. 193.
edit. GMEL. p. 328.

ALLIONE in *Att. Helv.* IV. p. 271.

LAMARCK *Enc. Method.* II, 1. p. 128.

PETAGNAE *Instit. Bot.* II. p. 334.

GAERTNER *de fr. et sem. pl.* I. p. 231. *Tab. L.*
fig. 7.

WULFEN in IACQUIN *ic. rar.* t. XXXII.

Illustrations des Genres (Planches pour l'Encycl.
method.) Ire. livr. Tab. XCIX.

Cortusa foliis cordatis petiolatis. LINN. *Hort. Cliff.*
p. 50.

Sanicula montana latifolia laciniata. C. BAUH. *Pin.*
p. 243.

S. alpina, f. *Cortusa* Matth. RAIH *Hist.* p. 1084.

Habitat infrequens in alpibus.

Germaniae

WULFEN in IACQ. *Collect.* I. p. 236, 37.

HOST. *Syn. pl. Austr.* p. 99.

†

KROCKER *Fl. Siles.* n. 297.

†


Sanicula alpina f. *montana altera*. CLUS. *var. Pann.*
p. 442. *Hist.* I. p. 307.

Italiae

Italiae (in umbrosis ex valle *Exilliarum* ubi adscenditur jum-
gum *Assiete*. Nascitur quoque in summa valle *di Cbison*
inter les Traverses et Sestriers. Oritur quoque inter
Tignes et locum *Laval*.)

ALLION. *Fl. Pedem.* I. p. 93. n. 340. *Tab.* V. f. 3.
Floret Majo, ad finem Junii. ♂? ♀?

Radix teres, crassiuscula, extus fusca, fibris co-
piosissimis undique, longissimisque et pene capillaribus.
Stipi ex ea, inter plurima folia, exsurgunt duo ad tres,
spichamam alti, teretes, saturate virides, aphylli, villosi,
apice umbelliferi. *Involucrum* 4-5 phyllum, foliolis li-
neari-lanceolatis, ferratis, planis, saturate viridibus,
villosis. *Flores* plerumque septem ad octo, longe pedun-
culati, pedunculis inaequalibus, teretibus, villosulis, pri-
mum nutantibus, tandem erectis. *Calyx* monophyllus,
tuboloso-turbanatus, quinquefidus, erecto-patens, viri-
dis, villosulus, laciniis lanceolatis, dorso striis elevatis
tribus, persistens. *Corolla* rotata tubo brevi, albo, limbo
quinquelobo, eleganter dilute rubro, demum expallescen-
te, laciniis ovato-rotundatis integerrimis, fauis annulo
elevato, fauce pervia, alba. *Stamina* quinque brevissima
alba, tubo corollae affixa. *Antherae* oblongae, flavae.
Germen ovatum, nudum. *Stylus* albus, corolla longior:
stigma simplex, oblongum, crassiusculum, rubellum.
Capula ovato oblonga, utrinque sulco depresso-usculo in-
scripta, unilocularis, bivalvis: valvis maturis apice saepe
bisidis. *Semina* plura: inferiora subrotunda; superiora
magis ovata, utraque hinc leviter convexa, inde obtu-
fissime angulata, punctis elevatis contiguis conspersa, fer-
ragineo-fusca. *Folia* tantum radicalia, saturate viridia,
superne nitentia, longe petiolata, utrinque cum petiolo villis
exstantibus hirsuta, reniformi-multifida, aut cordato-sub-
palmarata, lobis inciso-ferratis. *Odor* tenuis, suavis, mellitus.



Lycoperdon phalloides

Vogel sc:

LYCOPERDON PHALLOIDES.

Säulenförmiger Kugelschwamm. Columnar
Puff - ball.

Cryptogamia Fungi.

CHAR. GEN. *Fungus* subrotundus, *Seminibus* fari-
naceis repletus.

LYCOPERDON *phalloides* volvâ subterranea radicata tri-
plici, stipite centrali parietem internum pulveru-
lentum cum portione externorum elevante.
SMITH *Spic. Bot. Fasc. I.* p. 11. Tab. XII.

A new plant of the order of Fungi. WOODWARD
in *Philos. Transact.* Vol. LXXIV. p. 423.
tab. XVI.

L. volvatum stipitatum, pileo deflexo campanulato,
supra pulverulento calyprato, infra glabro
libero. DICKS. *Fasc. crypt. I.* p. 24.

LINN. S. N. ex edit. GMEL. p. 1464. n. 28.

*Habitat in aggeribus arenosis, prope Norwich Nor-
folkiae. Gul. Humphrey Circa Bungay Suffolciae legit
Thomas Jenkinson Woodward. ◎.*

Volva exterior ovata, carnosa, albido - fusca, unciis
6 ad 8 sub terra recondita, fibrillis aliquot albidis, flocco-
sis, e parte inferiori, radicata; *media* ejusdem figurae
sed longe tenuior, et fere membranacea, exteriori muci-
lagine connexa, intus glabra; *intima* figura caeterarum,
extus villosa, seminibus pulverulentis luteo - fuscis copio-
fissimis tecta; intus concava, glabra. *Stipes* intra cavi-
tatem

LYCOPÉDON PHALLOIDES.


tatem volvae interioris formatur, cylindricus, rectus, carnosus, mucilagine repletus, brevis; postea vero mirâ vi atque celeritate sursum elongatur et e terrâ protruditur, totam fere volvam intimam, apicî ejus adnataam, portione integumentorum externorum pari modo dilaceratorum tectam, gerens; postea statim exsuccus uti et volvae, atque levissimus, intus tubulosus, fit, extusque fibrosus; ventis tandem imbribusque vexatus et dealbatus, per longè durat.

Explicatio Tabulae.

- Fig. 1. Portio volvae exterioris.**
 - 2. Volvae intimae reliquum.**
 - 3. Volvae mediae portio.**
 - 4. Stipitis abscissi pars inferior.**
 - 5. Pars interna volvae interioris stipite elevatae.**
 - 6. Pars externa seminifera.**
 - 7. Fragmentum volvae mediae.**
 - 8. Fragmentum volvae externae.**
-



Malaxis paludosa



MALAXIS PALUDOSA.

Sumpf - Ragwurtz. Marsh Tway-blade.

Gynandria Diandria.

CHAR. GEN. *Nectarium* cordatum concavum, postice acuminatum, medio genitalia fovea. (*Corolla resupinata.*)

MALAXIS paludosa scapo pentagono, foliis spathulatis apice scabris.

OPHRYS *paludosa* bulbo subrotundo, scapo subnudo pentagono, foliis apice scabris, nectarii labio integro. LINN. *Sp. pl.* p. 1341. *Syst. Veg.* Ed. XIV. p. 813. *Edit.* GMEL. p. 57. n. 14. *Fl. Suec. ed. 2.* p. 316. n. 813.

Epipactis 8. HALL. *Auct. Helv.* III. p. 123.

ROSE'S *Elem. (App.)* 450. t. 11. f. 3.

PETAGNAE *Instit. bot.* IV. p. 1736.

EHRHART'S *Beytr.* III. S. 70.

Epipactis paludosa SCHMIDT *Orch.* in MAYER'S *phys. Auff.* I Th. S. 245.

Habitat in paludibus turfosis.

Germaniae (Holsatiae, Megapol., Hannoverae, Palatinatus, Berolini, Wildeshusii)

ROTH *Fl. Germ.* I. p. 381. II, 2. p. 401. cuius Synonymis adde:

EHRH. l. c.

Bohe-

Bohemiae (in circulo Pilsnensi circa Planam, rara)

Fr. W. SCHMIDT *Fl. Bohem. Cent.* I. p. 71. n.
LXXXIII.

Sueciae

LINN. *Fl. Suec.* I. c.

RETZII *Prodr. Fl. Scand. Edit.* 2. p. 207. n. 1099.

LILIEBLAD'S *Utkast.* p. 214.

Norvegiae

GUNNER *Fl. Norveg.* II. p. 121. n. 965.

Angliae

Orchis minima bulbosa. RAI^I *Syn.* 378.

RELHAN *Fl. Cantabr.* p. 337. n. 656.

HUDS. *Fl. angl.* 389.

WITHERING *Bot. Arr.* 989.

SOWERBY'S *engl. Bot.* XXIV. 72.

Scotiae

LIGHTFOOT'S *Fl. Scot.* I. p. 525.

crescit inter Typhas et Arundines, rara; floret
Julio et Augusto. 24.

Bulbus adscendens ramo e latere bulbi emarcidi
anni praeteriti (unde quasi catenatim cohaerent) ovatus,
compressiusculus, glaber, infra radicans. Scapus erectus,
digitalis, palmaris, basi tantum foliosus, pentagonus. Folia
rauicalia, plerumque tria, rarius quatuor, alterna, vagi-
nantia,

nantia, spathulata, vix uncia longiora, apice scabriuscula. *Flores* exigui, viridiflavicantes, in *Spicam* laxam, tenuem, filiformem, fere digitalem dispositi, pedunculati, *bractea* minutissima, lanceolata interstincti. *Petala* quinque. *Duo* exteriora superiora, ovata, acuminata, reflexo-erecta, leviter carinata. *Unum* inferius, l. labellum nectarii latolanceolatum, obtusum, integrum, convexum, reflexum. *Duo* interiora lateralia, linearia, obtusa, teneriora, vix breviora, recurva. *Nectarium* in medio floris ovatum, antice cordatum, postice acuminatum, secundum petala exteriora superiora erectiusculum, concavum, petalis brevius, caducius, pallidius, lineis exalbidis leviter striatum. *Antherae* subsessiles, duae, oblongae, apice foveolae styli. insertae et insidentes, antice operculo erecto obcordato concavo tectae. *Germen* inferum, lineare, sub flore incastratum, apice antheriferum. *Stigma* obtusum, anticum sub antheris. *Capula* oblonga, basi attenuata, sulcis carinisque tribus notata, unilocularis, trivalvis. *Semina* minutissima.

OBS. I. Quam sub nomine OPHRYDIS *paludosae* Tab.

877. *Florae Danicae* sicut sit planta, est O. Loefelii.

II. Pace benevoli Lectoris, cel. EHRHART, pie defuncti, observata circa hanc speciem, verboteinus heic apponam:

Postamentum, filiforme, semiunciale, et unciale.

Folia tria s. quatuor, obovata, alterna, apice crenulata, vaginis inferne postamentum, superne bulbum includentia.

Bulbus fructificans ovalis, postamento insidens.

Scapus

MALAXIS PALUDOSA.

Scapus nudus, ex apice bulbi, ad basin tantum folio summo paululum vaginatus.

Bulbus junior, s. novus, ad basin bulbi fructificantis, foliis propriis involutus, vaginisque maternis circumdatus, cuius postamentum dein praecedentis in modum elongatur, foliaque explicantur, bulbus ipse autem anno sequenti scapum emittit, bulbumque novum parit.



Valeriana Jupina



VALERIANA SUPINA.

Kriechender Baldrian. Valeriane couchée.

Triandria monogynia.

CHAR. GEN. *Perianthium* nullum, aut superum, per maturitatem in pappum sessilem plumosum resolubile. *Corolla* monopetala, vel regularis, vel irregularis, interdum calcarata. *Semen* unicum, calyce corticatum. *Stam.* 1—4.

VALERIANA supina floribus triandris subtetrandrisque, involucellis hexaphyllis trifloris, foliis integris, ciliatis; radicalibus obovatis; caulinis lanceolatis. WULFEN in *Jacq. Misc. Tom. II.* pag. 114 119. Tab. XVII. Fig. 2.

LINN. *Syst. Veg. ed. XIV.* p. 81. edit. GMEL. p. 92.
n. 20. *mant.* p. 27.

ARDUIN. *Spec. II.* p. 13. tab. III.

Valeriana alpina, foliis integris, radice repente,
inodora. RAIH *Hist. I.* pag. 389.

MORISON *Hist. Oxon.* III. p. 102.

PLUKNET *Almag.* p. 380.

TOURNEFORT *Inflit.* I. p. 131.

TILLI *H. Pif.* p. 169.

HALL. *opusc.* p. 187.

Valeriana montana minor italicica, foliis integris,
radice repente. BARREL. *rar.* p. 15. Tab.
868.

Humi-

Humida, eaque pingua, nonnunquam tamen et arenosa ad rivolorum latera summarum alpium incolit loca

Helvetiae

RAJUS l. c.

Germaniae (in humidis summarum Tyrolim inter et Giliensem Carinthiae vallem interiectarum, alpium locis, *in dem innersten Läserz gegen die Luggau zu*; tum ubi ex summa alpe Kirschbaumensi prope Lienz ultra adscenditur per horam, parumper versus orientem, ad ipsas nives; denique, ex delatis inde seminibus *in der öden Au bey Lienz, wo der Draag sich zu ergießen pflegt etc.* WULFEN. In Tyroli in humidis celsissimi montis *Donnersberg* prope *Sterzing.* HOST.)

WULFEN l. c.

HOST *Syn. pl. Austr. p. 23.*

Italiae

BARRELLIER l. c.

ARDUINUS l. c.

Floret Julio, Augusto. ḫ.

Descriptio cel. WULFEN. *Radix* perennis, sordide ex albo sublutescens, teres, vix calami anserini crassitudine, lenta, nodosa, nuda, repans, ramosa, ramis aut summo ex cespite, aut certe e gemmis undique sparsis, vase enatis, diffusis, et ipsis rursum teretibus, nudisque, **caulifera**; odore et sapore prorsus non insigni, minime vero eo VALERIANAE *cellicae*. *Caules* humiles, plus minus

nus pollicares, errecti suberectique, teretiusculi, levissime (saltem in prima aetate) villosuli, duorum triumve, rarius quatuor, geniculorum, apice corymbo florum terminati, *foliis* non aliis quam ad geniculorum exortum onusti; iisque simplicibus, oppositis, connato-sessilibus, oblongis, integris, nudis, per oras praecise pilo - ciliatis, inferioribus subovato - lanceolatis; iis contra foliis, quae ad caulis basin caput radicis cujusque, polypetalae instar *roseae*, coronant, plurimis, crassiusculis, aveniis, errecto - patentibus, nudis, margine solo pilo - ciliatis, caeterum integris, oblongo - obovatis, etiam, quod varius accidit, oblongo - subovatis cum fine obtuse acutiusculo; qualia autem demum fuerint cunque, semper in *petiolum* longiusculum veluti decurrunt. *Flores* in corymbo terminali jam parciores, jam copiosiores, magisque slipati; ordinario paulo infra verticem *pedunculis* binis, brevibus, axillaribus, oppositis, ad eandem cum caule altitudinem adscendentibus, trifloris. *Flos* quisque intra *bracteolas* binas, linearis - lanceolatas, margine ciliatas, sessilis; hocque demum illud Linnaei involucrum hexaphyllum, *bracteolae* scilicet trium universe florum sex. *Germen* inferum, sessile intra dictas *bracteolas*, iisque primum brevius, erectum, ovato - oblongum, striatum, nudum, in apice margine circulari protuberante coronatum ex pappo plumoso, hac in aetate spiraliter adhuc sursum convoluto. *Calyx* nullus. *Corolla* rubella seu aquose rosea, tandem plus minus albescens, obverse conica, tubulosa, tubulo brevissimo, intra umbilicum germinis levissime haerente, sessilis, gibbo laterali nectarifero, paulo supra basin hinc extante, fauce pervia latefciente ampla, limbo quinque partito, errecto - patente; laciniis oblongo - ovatis et integrimis.

VALERIANA SUPINA.

gerrimis. *S^tamina* regulariter tria, tamen etiam quater-
na, parieti interno corollae supra tubum inserta; filamen-
tis jubulatis, albis, ultra faucem exsertis, ipsaque tandem
corolla longioribus. *Antherae* subrotundae, albidae cum
rul edinis tinturā, polline dilute flavente. *Stylus* altitu-
dine corollae, albus, apice in *stigma* obtusum subcapita-
tum abiens, denique deciduus. *Semen* oblongo-ovatum,
compressiusculum, striatum, dilute fuscescens, apice ipso
strangulatum, et coronatum pappo plumoso longo in he-
misphaerium connatum patente.



Vicia lathyroides



VICIA LATHYROIDES.

Blatterbsenartige Wicke. Vesce gessiére.

Dwarf - Vetch.

Diadelphia Decandria.

CHAR. GEN. *Stigma* latere inferiore transverse barbatum.

VICIA *lathyroides*, (** *Floribus axillaribus, subsessilibus*) leguminibus sessilibus solitariis erectis glabris, foliolis senis: inferioribus obcordatis. LINN. *Spec. plant.* II. p. 1037. *Syst. Veg. ed.* XIV. p. 664. *edit.* GMEL. p. 1112.

AIT. *Hort. Kew.* III. p. 45.

Vicia montana minima, flosculo purpureo. *Amoen. Acad.* I. p. 167.

RETZII *Obs. bot.* Fasc. I. p. 24. n. 83.

Habitat in montosis, apricis, sabulosis.

Germaniae

ROTH *Fl. Germ.* I. p. 310. II, I. p. 187. Cujus Synonymis adde:

WULFEN in IACQ. *Misc.* Vol. II. p. 299—302.

SCHKUHR *bot. Handb.* II. S. 362.

HOST *Synops. pl. Afric.* p. 399.

Hungariae

LUMNITZER *Fl. Poseniens.* p. 312.

Galliae

VICIA LATHYROIDES.

Galliae

VILLARS *Hist. des Plant. du Dauphiné* Vol. III.
p. 452.

LAMARK *Fl. franç.* II. p. 565.

Italiae

ALLIONE *Fl. Pedem.* I. p. 326. n. 1202. Tab. LIX.
f. 2.

PETAGNAE *Instit. bot.* IV. p. 1377. n. 12.
ab UERIA *Hort. Panorm.* p. 307.

Belgii

de GORTER *Flora VII. Provinc.* p. 193.

Angliae

Vicia minima praecox Parisiensium. RAI^I *Syn.*
p. 321.

Ervum feloniense. HUDSON *Fl. Engl.* edit. I. p. 279.

RELIAN *Fl. Cantabrig.* p. 274. n. 526.

HUDS. *Fl. Engl.* ed. 2. p. 319.

SOWERBY'S *Britt. Bot.* X. n. 30.

Poloniae

Vicia minima. GILBERT *Fl. lithuan.* in USTERI
delect. II. p. 371. n. 202.

Sueciae

LILIEBLAD'S *Utkast.* p. 256.

Danicae

Fl. Dan. t. 58.

O. FR. MÜLLER *Fl. Friedrichsdal.* p. 133. n. 588.

RETZII *Prod. Fl. Scand.* p. 171. n. 892.

Floret

Floret Aprili, Majo. ♂.

Radix fibrosa, subinde granulata, *caulem* unum alterumve profert, suberectum, semidigitalem, digitalem, et majorem, basi parum ramosum, debilem, subangulosum. *Folia* sunt pinnata ex foliolis utrinque sine impari frequentius tribus, etiam duobus, ad caulum basin ex folio jugata solummodo utrinque uno. Sunt autem *foliolas* valde varia. In infimis foliis sunt obverse cordata; in proximis magis oblonga, et retusa; reliqua anguste lanceolata, longiora, per setulam acuminata; omnia subfessilia et pilis albis utrinque hirsuta. *Petioli* in infimis acuti, in superioribus plerumque in cirrhum simplicem elongantur. *Stipulae* sunt semisagittatae, villosae. *Flos* solitarius in alis et sessilis erigitur. *Calyx* hirsutus et *corolla* fere duplo brevior denticulos omnes habet etiam longitudine aequales. *Vexillum* cum purpura caeruleum est, fere subrotundum cum ungue albo canaliculato et longo, emarginatum cum denticulo, erectum, et expansum. *Alae* magis caeruleae, pauxillo breviores, concavae, obtusissime, erectae, oblongae, *ungue* praeditae tenui alboque. *Carinna* subrotunda, parva, compressa, obtusa, pallens cum macula fusca, vix calyce longior; ungue bifido, longo et pallente. *Filamenta* longitudine carinae. *Germen* oblongum, compressum. *Stylus* brevis, recurvatus. *Stigma* ciliatum, tum superne supra apicem valde barbatum. *Legumen* oblongum, subunciale, anceps, obsolete simul tetragonum, acuminatum, nigrescens, nitidum. *Semina* circiter fena, subcubica, et cinerascentia.

Variat:

Cirrho nullo et folii costa in acumen brevissimum recurvum tantummodo producta.

Foliis

VICIA LETHYROIDES.

Foliis superioribus quadrijugis; foliolis linearibus angustissimis, retusis.

OBS. Differt a VICIA *angustifolia* I. Habitu toto tene-
riore. Foliolis etiam superioribus retusis, cum
brevi mucrone. 3. Floribus et leguminibus sem-
per solitariis. Cirrho semper simplici, saepius de-
ficiente, praecipue in foliis inferioribus.





CAMPANULA CARPATICA.

Glockenblume von den Carpathen. Campanule
des Carpathes. Heart - leav'd
Bell - flower.

Pentandria Monogynia.

* *Fl. Monopetali*, superi.

CAMPANULA *carpatica* foliis omnibus cordatis ferra-
tis petiolatis glabris, ramis filiformibus uniflo-
ris. AIT. *Hort. Kew.* I. p. 219.

LINN. *Suppl.* p. 140. *Syst. Veg.* edit. XIV. p. 207.
edit. GMEL. p. 349.

PETAGNA *inflit. bot.* II. p. 360.

CURTIS *Bot. Mag.* t. 117.

Habitat in

Pannonia (in alpibus Carpaticis comitatus Scepusiensis)
IACQ. *Hort. Vindob.* Tom. I. p. 22. Tab. XXXVII.
HOST *Synops. pl. Austr.* p. 107.

Floret Julio. In Hortis facile colitur et per semi-
na propagatur, ibidemque Iunio et Julio floret. 4.

Radix fibrosa, albicans. Caules herbacei, annui,
debiles parum vel non ramosi, hirsuti vel glaberrimi, aut
unicum aut paucissimos flores sustinent. (In Horto plan-
ta evadit multiramosa et multiflora). *Folia radicalia*
reniformi subrotunda: *caulina cordata*, petiolata, nitida,
inaequaliter ferrata, ferraturis undulatis et obtusis cum
acumine. *Pedunculus elongatus et glaber sustinet florem,*
amplum, coeruleum, patentissimum, glabrum. Calycis
non

CAMPANULA CARPATICA.

non minus nitidi foliola sunt lanceolata, superne ferrata aut integerrima et acuminata. *Nectarium* villosum. *Stigmatis* laciniae crassae, magnae, superne sulcatae, subtus villosae. *Capula* oblonga, glabra, trisulcata, angulis obtusis et lineatis, trilocularis. *Semina* oblonga.

OBS. Non potest pro varietate *C. grandiflorae* haberi; nam *C. carpatica* caulis ascendens, *grandiflorae* erectissimus; illius cultura ramosissimus, hujus et sub illa simplex; illius folia perpetuo cordata omnia, hujus plane nulla. etc. IACQ.



Cucubalus Oiticicæ



CUCUBALUS OTITES.

Ohrlöffel-Cucubalus. Ohrlöffleinkraut. Carnilet f. Cucubale parviflore. Spanish Cam-pion or Catchfly.

Decandria Trigynia.

CHAR. GEN. CALYX *Perianthium* inflatum quinque-dentatum. *Petala* quinque unguiculata absque denticulis ad faucem *Capsula* trilocularis ad faucem dehiscens.

CUCUBALUS *Oties* floribus dioicis, petalis linearibus indivisis. LINN. *Spec. pl.* I. p. 594. *Hort. Cliff.* 272. *Syst. Veg. edit.* XIV. p. 419. *edit.* GMEL. p. 713.

LAMARCK *Encycl. Meth.* II. p. 221.

PETAGNA *inflit. bot.* III. p. 807.

VITMAN *Summa plant.* III. p. 89.

PLENCK *ic.* t. 348.

AITON *Hort. Kew.* II. p. 93.

Lychnis viscosa flore muscofo. C. BAUH. *Pin.* p. 206. RAI^I *Hift.* 1002. et 1895.

Muscipula muscofo flore f. *ocymoides* bellidiforme I. BAUH. *Hift.* III. p. 350.

Lychnis sylvestris *sesamoides* minor, flore muscofo. MENTZ. *pug.* t. III. f. 2.

Lychnis viscosa flore muscofo, majusculo, quae sterilis.

— — — — — , minore et femini-fera. TOURNEF. *inflit.* I. p. 336.

Habi-

Habitat in collibus siccis, apricis.

Helvetiae

SCHEUCHZ. *It. alp.* VII. p. 514.

HALL. *Hist. pl. Helv.* n. 920.

Germaniae

ROTH *Tent. Fl. Germ.* I. p. 192. II, I. p. 492.

Cujus Synonymis adde :

SCHRANK *Bai. Fl.* I. n. 677.

SCHKUHR *bot. Handb.* I. S. 385. n. 1135.

BORKHAUSEN *Rhein. Mag.* I. S. 523. *Catzenelnbog.*

Flora S. 456.

HOST *Synops. pl. Austr.* p. 238.

†

SCOP. *Fl. Carn. edit. 2.* T. I. p. 305. n. 515.

† †

KROCKER *Silef.* n. 662.

Hungariae

LÜMNITZER *Fl. Pos.* p. 177. n. 422.

Galliae

MAGNOL *H. R. Monsp.* p. 127.

VAILLANT *Bot. Paris.* p. 120. n. 4, 5.

COUAN *H. R. Monsp.* p. 215. *Fl. Monsp.* p. 279.

VILLARS *Fl. Delph.* III. p. 615.

LAMARCK *Fl. franç.* III. p. 26. (*CUCUBALUS parviflorus.*)

Italiae

La Muscipula seconda con flor muscosa del Lobelio.

PONA *Monte Baldo* (4. Venet. 1617.) p. II.

SEGUIER *Pl. Veron.* I. p. 426. n. 4, 5.

ALLIONE

CUCUBALUS OTITES.

ALLIONE *Fl. Pedem.* II. p. 84. n. 1888.

ab UERIA *Hort. Panorm.* p. 185.

Hispaniae

CLUSII *Hisp.* (8°. Antv. 1576.) p. 344. Sesamoides magnum Salmanticum.

del ASSO *Arragon.* n. 373.

Belgii

DE GORTER *Fl. VII. Provinc.* p. 117. n. 373.

Daniae

Fl. Dan. t. 518.

RETZII. *Prodr. Fl. Scand.* ed. 2. p. 105. n. 537.

Poloniae

Cucubalus dioicus. CILIBERT *Fl. Lithuan.* in USTE-
RI *deleit.* II. p. 389. n. 260.

Angliae

Lychnis viscosa flore muscofo. RAI^{II} *Synops.*
p. 340.

RELHAN *Fl. Cantabr.* p. 168. n. 319.

HUDS. *Fl. angl.* p. 186.

WITHERING's *bot. Arr.* p. 446.

SOWERBY's *Engl. Bot.* XXVII, 85.

Floret, Iunio, Julio. 24.

Radix fusiformis, profunde serpens. *Folia radica-*
lia in cespitem congesta, angusta, spathulata, integra,
acuminata, in petiolum decurrentia: *caulina* opposita,
connato - fessilia, lanceolato - acuminata, subpubescentia.
Caules plures, ex una radice, pedales et altiores, errecti,
teretes, pubescentes, geniculati, hinc inde viscidi. *Flo-*
res

res verticillati in racemum terminalem dispositi, pedunculati, parvi, *bracteis* membranaceis interstincti, e viridi flavescentes, masculi et foeminei plerumque in diversa planta. *Masculi* paulo maiores, *calyce* subrubro, viridi-striato, *petulis* angustis, linearibus, integerrimis, versus apicem incurvatis, *flaminibus* alternatim minoribus, rudimento *germinis* trigyni plerum abortiente. *Foeminei* minores, ita ut petala a nonnullis observatoribus fuerint praetervisa. *Capula* elliptica, sexvalvis.

Variat:

floribus hermaphroditis, sicuti in *Tataria* provenit.

Cf. HALLER *Enum. plant. Hort. Goett.*
p. 151.

altitudine. Plantae masculinae saepius 4-5, foeminae nonnisi trium pedum altitudinem attinere dicuntur.

OBS. Angli modo Lichenem terrestrem, modo hanc plantam, pro ea habebant, cuius infusum vinosum cum theriaca adversus canis rabidi morbum (SLOANE in Epistola ad RAJUM a DERHAMIO edita, *Phil. Trans.* n. 403.) antidoti vires possideat. Nunc autem meliora edocet.

Contenta Fasciculi tertii.

Alyssum sinuatum. L.

Cortusa Matthioli. L.

Lycoperdon phalloides Woodw.

Malaxis paludosa L.

Valeriana supina L.

Vicia lathyroides L.

Campanula carpatica. L.

Cucubalus otites. L.



F L O R A E U R O P A E A

I N C H O A T A

A

JOH. JAC. ROEMER

MED. ET CHIR. DOCT.

EORVNDEMQUE IN INSTITVTO MEDICO - CHI-
RVRCICO QVOD TVRICI FLORET,
PROFESSORE.

SOCIETATIS MED. ET CHIR. PER HELVETIAM CORRE-
SPONDENTIVM E MEMBRIS PRAESIDI ADIVNCTIS. SOC.
PHYSICAE TVRICENS. MEMER. ORDINARIO. ACAD. REG.
SCIENT. STOCKHOLMIENS. NATVRAE SCRVTATOR BERO-
LINENS. HALLENS. ET IENENS. AGRARIAE VICENTINAE,
PRIVATAE GOETTINGENS. MEMERO HONO-
RARIO.

FASCICVLVS IV.

NORIMBERGAE
EX OFFICINA RASPEANA
1799.




AMICO AESTUMATISSIMO
MAURIT. BALTHAS.
BORCKHAUSEN

M E D. D. D A R M S T A D I E N S I
C E T. C E T.

QVARTVM
FLORAE EUROPAEAE FASCICVLVM

D. D. D.

A U G T O R.





Agrimonia agrimonoides. Linn.



AGRIMONIA AGRIMONOIDES.

Dreyblättriger Odermennig. Aigremoine à fleurs en faisceau. Three leav'd
Agrimony.

Dodecandra digynia.

CHAR. GEN. *Calyx* oblongus, quinquefidus, calvculo minimo bipartito infra cinctus. *Petala* quinque calyci inserta patentia margine revoluta. *Semina* duo intra calycem capsularem bilocularem ventricosum setis persistentibus superne tectum.

AGRIMONIA *agrimonoides* foliis caulinis ternatis, fructibus glabris.

LINN. *Hort. cliff.* 179. 2. *Sp. pl.* p. 643. *Syst. Veg. ed.* XIV. p. 448. S. N. *ex edit.* GMEL. p. 757. n. 5.

Agrimonoides. COLUMN. *ecphras.* p. 145. *tab.* 144.

Agrimoniae similis. C. BAUH. *Pin.* p. 321.

BARRELIER *ic.* 612.

RAII *Hijt.* 400. n. 3.

Agrimonoides TOURNEF. *inst. R. Herb.* p. 301.

A. *Agrimonoides*. LAMARCK *Encycl.* I. p. 62, 63.

AITON *Hort. Kew.* II. p. 131.

Habitat in nemoribus umbrosis humentibus

Carnioliae

SCOPOLI *Fl. carn.* I. p. 331. n. 568.

WULFEN in IACQ. *Collecc.* Tom. II. p. 208-210.

HOST *Syn. pl. Austr.* p. 257.

Italiae

AGRIMONIA AGRIMONOIDES.

Italiae

PETAGNAE inflit. Bot. Tom. III. p. 899.

BERNARD. AB UCRICA Hort. Panorm. p. 194. (in monte Etna.)

Floret Majo & Iunio. 2.

Radix horizontalis, brachiata, fibrosa, emittens Caulis basi primum decumbentes, dein erectos, inter plurima Folia radicalia pinnata, pinnarum paribus 2-3, foliolo terminali majore, minoribus pinnulis intermixtis. Pinae ovatae, villosae, dentatae. Caulis teres, villosus, alterne ramosus, debilis, foliis caulinis ternatis. Stipulae ovatae, acuminatae. Flores terminales, corymbosi, duo, tres, quatuor, raro sex, singuli pedunculati. Calyx duplex: inferior major, tubulofo-dentatus, dentibus a septem ad decem profunde et inaequaliter incisus, erectus, striatus, villosus patentissimus, tubulosa in basi includens germen oblongo-ovatum, sericeo-pubescent: superior minor, quinque partitus, laciniulis corolla brevioribus, ovato-acutis, aequalibus, glabris, patentibus, anthesi finita conniventibus & persistentibus. Corolla saturate flava, pentapetala, petalis obovatis, apice emarginatis, basi in unguiculum decurrentibus, patentissimis, caducis. Stamina 6, 7, 8, nec plura, corollis paulo breviora, filamentis flavis, antheris didymis, saturatius flavis. Styli duo, staminum altitudine, albi. Stigmata subcapitata, albida.

OBS. A ceteris Agrimoniiis discrepat haec species, foliis caulinis ternatis, corymbo plerumque 3-4 floro terminali, floribus 6-7-8 andris, calyce majore campanulato, multifido, capsula monosperma glabra non setosa: an genus distinguendum?



Erica daboezia. Linn.

Vogel. sc.



ERICA DABOECIA.

Myrthenblättrige Haide. Bruyére à feuilles de Myrte. Irish Wort, or Moorwort.

O c t a n d r i a M o n o g y n i a.

CHAR. GEN. *Calyx* tetraphyllus. *Corolla* campanulata vel cylindrica. *Stamina* thalamo inserta. *Stylus* unicūs — stigmate quadrifido. *Capsula* quadrilocularis, dissepimentis simplicibus axil adnatis, & ipsis valvularum futuris oppositīs, loculis polyspermis.

ERICA *Daboecia* (**antheris simplicibus* †*foliis alternis*) foliis alternis ovato-lanceolatis margine revolutis subtus tomentosis: corollis ovato-cylindricis, racemo terminali secundo.

LINN. *Sp. pl.* p. 509. n. 38. *Syst. Nat. ex edit.*
GMEL. p. 622. n. 1.

ANDROMEDA *Daboeci* LINN. *Syst. Veg. ed. XIV.*
p. 406.

Erica cantabrica, flore maximo, foliis myrti subtus incanis. TOURNEF. *Inst. R. H.* p. 603.

Erica St. Dabocci Hibernis D. Lhwyd. RAJ. *Hift.* III. *Dendr.* 98.

Erica Hyberonica foliis Myrti pilosis, subtus incanis.
PETIV. *Gaz. Nat. Tab.* 27. f. 4.

THUNBERG *Diss. de Erica* n. 1.

Habitat in

Hiberniae montibus Mayo squalido & spongioso solo frequens; at & per totum Hair-connaught in Gallovidia.

RAJ.

RAJ. *Syn.* p. 472.

HUDSON *Fl. Engl. ed. I.* 143. (*Vaccinium canticum*).

Fl. Engl. ed. 2. p. 166.

SOWERBY'S *Engl. Bot.* n. 35.

WITHERING *bot. Arr. 3d. Edit. Vol. II.* p. 372.


Gallia

LAMARCK *Encycl. méthod. I., 2.* p. 483. no. 75.
(aux environs de Bajonne.)


Floret Iunio & Julio. Apud nos in ollis colitur. \mathfrak{h} .

Caulis erectus, spithameus. *Rami* alterni, pauci, pilosi, divaricato-patentes. *Folia* alterna subfessilia, inferiora ovata; superiora - erecto patentia, ovato-lanceolata, acuta, integra; supra viridia, glabra, fulco longitudinali, rariissime pilosa, subtus albo-tomentosa, margine revoluto. *Racemus* terminalis simplex, floribus alternis secundis, *pedicellis* unifloris, subviscidis, subtus *Braetia* linearis longitudine pedicellarum. *Calyx* 4-phyllos, subulatus, erectus, purpurascens, viscidis pilis glandulosus, corolla quadruplo brevior, deciduus. *Corolla* rubro-violacea, cylindrico-ovalis, ore parum coarctato 4-fido, laciniis reflexis. *Stamina* 8, filamentis albis. *Antherae* longitudine filamentorum, vix corolla breviores, fuscae, sagittatae, muticae, apice biperforatae. *Stylus* filiformis, longitudine corollae. *Stigma* integrum concavum. *Capsula* quadrilocularis quadrivalvis.

OBS. Facies tota Andromedae, Numerus Ericae est. Vera autem essentia generis in capsula supera, dissepimentis e marginibus valvularum inflexis, nec e medio eare alio (ut in Andromeda) formatis, consistit. Hinc ANDROMEDA *Daboeci droseroides* & *caerulea* LINN. Syst. Veg. ad Ericas removendae sunt.



Chlorantha perfoliata



CHLORA · PERFOLIATA.

Durchwachsene Chlorä. Yellow Wort, or perfoliated Centory. Chlorä perfeuillée.

O c t a n d r i a M o n o g y n i a .

CHAR. GEN. *Calyx* octofidus. *Corolla* monopetala, octofida, infundibuliformis. *Stamina* numero laciniarum corollae. *Stigma* bilobum, bifidum-ve. *Capcula* unilocularis, bivalvis, polysperma.

CHLORA perfoliata, foliis perfoliatis. LINN. *Syst. Veg.* ed. XIV. p. 361. *Syst. Nat. ex edit.* GMEL. p. 618.

GENTIANA perfoliata. LINN. *Spec. plant.* p. 335.

Gentiana caule dichotomo, foliis connatis, corollis octofidis. LINN. *Hort. Cliff.* 81 & 496.

Centaurium luteum perfoliatum. C. BAUH. *pin.* p. 278. TOURNEF. *instit. R. Herb.* I. p. 123.

Perfoliatum Centaurium. I. BAUH. *Hist.* III. p. 355.

Chlora. RENEALM. *Sp. 80.* t. 76. ADANSON *Fam. des plant.* II. p. 503.

LAMARCK *Enc. Method.* I, 2. p. 730.

AIT. *Hort. Kew.* II. p. 8.

SCHKUHR *Bot. Handb.* 1 Band. S. 329. Tab. CVI.

Habitat in pratis & pascuis montosis siccis, solo calcareo

Helvetiae

HALL. *Hist. fl. Helv.* II. p. 289. n. 649. *Nomencl.* n. 649.

Germaniae

ROTH *Tent. Fl. germ.* I. p. 168. II, 1. p. 440.
Cujus *Synonymis* adde:

CHLORA PERFOLIATA.

HOFFMANN'S *Deutschl. Flora*. S. 134.

HOST *Synopf.* p. 210.

Bohemiae

Fr. W. SCHMIDT *Fl. Bohem. Cent.* IV. p. 86. n.
CCCLXXXIV.

Angliae

RAII *Syn.* p. 287.

RELHAN *Fl. Cantabr.* p. 157. n. 301.

HUDSON *Fl. Engl.* ed. 1. p. 146. (BLACKSTONIA
perfoliata.) ed. 2. p. 168.

SOWERBY's *Engl. Bot.* n. 60.

WITHERING's *Bot. Arrang.* 3d. ed. Vol. III. p. 369.

SIBTHORP *Fl. Oxon.* p. 123. n. 368.

Belgii

de GORTER *Fl. VII. Provinc.* p. 106. n. 341.

Galliae

VAILLANT *Bot. Paris.* p. 32. n. 5.

VILLARS *Hist. des plant. du Dauph.* III. p. 512.

LAMARCK *Fl. Franç.* p. 313. n. 358.

Lusitaniae

VANDELLI *Fl. Lusit. & Bras. spec. in ROEMER
Script. de plant. Hisp.* p. 101.


Floret Iunio, Iulio, Augusto. ⊖.

Caulis erectus, palmaris, pedalis, teres, glaberrimus,
geniculatus, superne tantum ramosus, dichotomus. *Folia*
opposita connato-perfoliata, ovata, acutiuscula, integerri-
ma, glabra, laete viridia vel glaucescentia. *Flores* in pa-
niculam dichotomam dispositi, flavi. *Calycis* laciniae line-
ares. *Corollae* laciniae ovatae, obtusae. *Stigmata* in-
craffata. *Capula* ovato-tetragona, unilocularis, bivalvis,
polysperma.



Anemone vernalis

Vogel



ADONIS VERNALIS.

Frühlingsadonis. Perennial or Spring-Adonis.

Adonis printanier.

Polyandria Polygynia.

CHAR. GEN. *Calyx* pentaphyllus. *Corolla* polypetala.
Styli nulli. *Ovaria* plurima. *Stigmata* sessilia reflexa. *Receptaculum* oblongum. *Pericarpia* (*Capsulae* GAERTN.) plurima, rostrata, monosperma.

ADONIS *vernalis* flore dodecapetalō, fructu ovato. —
LINN. Sp. pl. p. 771. n. 3. Hort. Cliff. p. 231.
Oelandsk. ref. p. 73. Fl. Suec. n. 456. ed. 2.
n. 492. Synt. Veg. ed. XIV. p. 514. Synt. Nat.
ex edit. GMEL. p. 876. n. 7.

Helleborus niger tenuifolius, buphthalmi flore. C.
BAUH. pin. p. 186.

Buphthalmum Dodonaei, aliis Consiligo tenuifolia Ioh.
BAUH. Hist. III. p. 637. RAI Hist. p. 597. I.

Ranunculus foeniculaceis foliis, Hellebore nigri radice. TOURNEF. inst. R. Herb. p. 291.

A. *vernalis* LAMARCK Enc. Method. I, I. p. 45.

PETAGNAE Institut. bot. III. p. 1037.

GAERTNER de fruct. & sem. plant. I, p. 355.

ADONIS VERNALIS.

AITON Hort. Kew. II. p. 264.

CURTIS Bot. Mag. n. 134.

SCHKUHR Bot. Handb. II. S. 108. n. 1490.

Habitat in collibus apricis

Helvetiae

HALL. Hist. stirp. Helv. II. p. 66. n. 1157. Non
mencl. n. 1157.

Germaniae

ROTH Tent. Fl. Germ. I. p. 242. II, 1. p. 624. Cu-
jus Synonymis adde:

SCHRANK Baj. Flora. II. p. 654. n. 1822.

BORKHAUSEN Rhein. Mag. I. S. 412. Catzenelnbog-
sche Flora. S. 22.

HOST Syn. pl. Austr. p. 308.

††

KROCKER Fl. Siles. 867.

Hungariae

ADONIS *apennina* LUMNITZER Fl. Poson. p. 228.
n. 537. nihil aliud quam mera Adoniæ
vernalis Varietas eſſe videtur.

Lusitaniae

VANDELLI Fl. Lusit. & Bras. spec. in RÖMER Script.
de plant. Hisp. p. 119.

Galliae

LAMARCK Fl. franç. III. p. 201.

GOUAN Hort. Reg. Monsp. p. 264. Fl. Monsp.
p. 322.

Sue-

ADONIS VERNALIS.

Sueciae :

LINN. *Fl. Suec.* l. c.

LILIEBLAD *Svensk Flora.* p. 189.

RETZ. *Prodr. Fl. Scand.* edit. 2. p. 130. n. 679.

Hortis Flos speciosus est, Aprili florens cum Tulipis & Epimedio. 24.

Caules plures ex una radice, palmares, erecti, simplices aut basi ramosi, pilis raris adspersi. *Folia* alterna, amplexicaulia, multifida: *foliolis* linearibus, angustissimis, molli spinula terminatis. *Pedunculus* terminalis, brevissimus, solitarius, uniflorus. *Calycis* foliola concava, villosa, striata. *Petala* citrina, lanceolata, lineata, duodecim & ultra. *Capsulae* plures, circiter viginti quinque, in spicam ovatocylindricam digestae, subglobosae, recurvato rostellatae, subcoriaceae, extus rugosae, intus lamina cartilaginea nitida vestitae, uniloculares, evalves. *Semina* solitaria, subglobosa, apice mucronata, rugosa, gramineo-viridia.

OBS. I. Dignoscitur ab *A. autumnali* capsularum mucrone reflexo & longiore. HALL. l. c.

OBS. II. Variat ramis floriferis & sterilibus. Hinc vehementer dubito, utrum ADONIS *apennina* IACQ. *Fl. austri.* Vol. I. tab. 44. aliud quidquam sit, quam *AD. vernalis* varietas.





Cypripedium Calceolus

Zegel sc.



CYPRIPEDIUM CALCEOLUS.

Gemeiner Pfaffenschuh. Frauenschuh. Ladies
Slipper. Sabot de Venus.

Gynandria Diandria.

CHAR. GEN. *Nectarium inflato - ventricosum.*

CYPRIPEDIUM *calceolus* radicibus fibrosis, foliis ovato-lanceolatis caulinis, petalis acuminatis.

C. *calceolus* LINN. Sp. pl. 1346. Syst. Veg. ed. XIV. p. 817. Syst. Nat. ex edit. GMEL. p. 62. Fl. Suec. p. 318. n. 820. Act. Ups. 1740. p. 24. Fl. Lapp. 318. Fl. Lapp. ex edit. SMITH p. 256. n. 318.

Helleborine flore rotundo, sive Calceolus. C. BAUH. Pin. p. 187. PETIV. Gazoph. t. 124. f. 10. Damasonii species quibusdam, f. Calceolus D. Mariae. Ioh. BAUH. Hist. III. p. 518.

Calceolus. RIVIN. Hexap. T. I.

Calceolus Marianus. TOURNEF. Inst. R. Herb. p. 437. MOENCH Method. p. 715.

Calceolus Mariae. RUDB. Hort. 19.

C. *calceolus*. AIT. Hort. Kew. III. p. 302.

Habitat in sylvis et nemoribus montosis

Helvetiae

Calceolus HALL. Hist. fl. Helv. II. p. 157. n. 1300. Tab. XLIII. Enumerat. p. 276. n. 1. Nomencl. n. 1300.

Cosmofandalos C. GESN. Epist. p. 96. b.

Ger.

CYPRIPEDIUM CALCEOLUS.

Germaniae

ROTH *Tent. Fl. Germ.* I. p. 383. II, 2. p. 411.
cujus Synonymis adde:

REYGER *tent. Fl. Gedan.* Tom. II. p. 141.

WEIGEL *Fl. Pomeran.* *Rug.* p. 167. n. 580.

KÖLPIN *Fl. Gryph.* *Suppl.* p. 94. n. 162.

SCHRANK *Baj. Fl.* I. S. 252. n. 95. *Primit. Fl. Salisb.* p. 31. n. 58.

Bohemiae

Fr. W. SCHMIDT *Fl. Bohem.* *Cent. IV.* p. 1. n. CCCI.

Hungariae

(*Erdei Sárga Paputs*; *Rigopóhár*; *Maria Czí-pökje.*)

Pseudodamasonium. CLUS. *Pann.* p. 271, 272.

C. *calceolus*. LUMNITZER *Fl. Poson.* p. 408. n. 906.

Galliae

Cypripedium foliis ovato-lanceolatis. SAUVAG. 24.

C. *Calceolus* GOUAN *Hort. Reg. Monsp.* p. 475.
Flora Monsp. p. 300.

VILLARS *Hist. des plant. du Dauph.* II. p. 54.

LAMARCK *Fl. Franc.* III. p. 522. n. 1109.

Italiae

Il Damasonio bastardo de' moderni. PONA Monte Baldo. p. 239.

SEGUIER *Pl. Veron.* II. p. 341.

C. *calceolus* ALLIONE *Fl. Pedem.* II. p. 151. n. 1847.

Daniae

O. Fr. MÜLLER *Fl. Friedrichsdal.* p. 164. n. 732.

Sueciae

LINN. *Fl. Suec. & Lapp.* l. c.

RETZII *Prodr. Fl. Scand.* ed. 2. p. 208. n. 1110.

LILIEBLAD *Svensk Flora.* p. 216.

Nor-

Norvegiae

GUNNER *Fl. Norveg.* II. p. 147. n. 1113.

Angliae

RAJI *Syn.* p. 385.

HUDSON *Fl. Engl.* p. 392.

WITHERING'S *bot. Arrang.* 3d. Edit. Vol. 2. p. 43.

SOWERBY'S *engl. Bot.* n. 1.

Hispaniae

QUER *Fl. Espann.* III. p. 375.

DEL ASSO in ROEMER *script. de plant. Hisp.* &c.
p. 35.

Lituaniae

GILIBERT in USTERI *Delect.* II. p. 288.

*Floret sub finem Maji & Iunio: pulcherrima plan-
ta non nisi cum quadam difficultate in hortis colenda.* 24.

Planta 8-10 pollicaris. *Radix* fusca, horizontalis, tuberosa, fibris crassis, fasciculatis, carnosis. *Caulis* viridis, erectus, simplex, teres, articulatus, hirto pubescens, felidus, herbaceus, marcescens. *Folia* 5 vel 6, viridia, alterna, sessilia, basi amplexicaulia, patenti-recurva, lanceolata, integrerima, nervis crassis hirsutis praecipue subtus praedita: *superiora* paulo angustiora magisque acuminata. *Flores* nutantes, solitarii, rarius duo. *Pedunculus* foliis brevior, e caule continuatus, structura omnino similis. *Braetea* solitaria sub germine, structura foliorum sed minus, magisque ovato-lanceolata. *Germen* viride, incurvulum, anguste pyriforme, 6-angulum, hirto-pubescent. *Petala* saturate fusca: *supremum* erectum, *infimum* deorsum directum ex ovali magis elongatum, plerumque contortum & apice bifidum: *lateralia* multo angustiora, parum

CYPRIPEDIUM CALCEOLUS.

parum longiora, patenti - deflexa, linearis attenuata, basi intus barbata: integerrima, obtusa, leviter hirto - pubescens praeferentim extus, tortuosa. *Labium superius* sordide flavum maculis fuscis, ultra lobos laterales styli inseratum, integerrimum, ellipticum, obtusum, utrinque laeve, supra concavum, subtus carina late canaliculata. *Labium inferius* amplissimum, flavum, petalis brevius, calceiforme, inflato - compressum, ore suborbiculare, extus laeve, intus basi barbatum lineis macularum fuscarum. *Stylus* flavus, laevis. *Lobi* laterales apice incurvuli, anguste cuneiformes, obtusi; medius oblongus, basi latior, medio angustatus, obtusus. *Antherae* flavae, paulo infra apicem loborum, quibus multo latiores, orbicularis, bilocularis. *Pollen* flavum. *Stigma* pallide flavum, basi triangulo umbilicatum, minute papillosum.

OBS. Speciosissima planta, vel alia species illi valde affinis, reperitur quoque in Sibiria (GMELIN *Sib. I. p. 2. t. I.*): Carolina (WALTER *Flora Caroliniana. p. 222*): Iaponia (THUNBERG *Fl. Iap. p. 30*): Tauride (P. S. PALLAS *Physikal. topogr. Gem. von Taurien. S. 121.*)



Antirrhinum alpinum

Lodd. sc:



ANTIRRHINUM ALPINUM.

Alpenlöwenmaul. Mufier des alpes. Alpine
Toad-Flax.

Didynamia Angiospermia.

CHAR. GEN. *Calyx* pentaphyllus. *Corolla* personata
basi gibba obtusa: labio superiori bifido reflexo:
inferiori trifido: fauce palati gibba clausa. *Sta-*
mina didynama: stamen quintum minimum ste-
rile. *Stigma* simplex. *Capula* bilocularis,
apice in lacinulas reflexas dehiscens. *Semina*
numeroſa.

ANTIRRHINUM *alpinum* (** *Foliis oppositis*) foliis
quaternis linearis lanceolatis glaucis, caule diffu-
ſo, floribus racemosis: calcari recto.

LINN. *Sp. pl.* p. 856. n. 23. *Syft. Veg. ed. XIV.*
p. 556. *Syft. Nat. ex edit. GMEL.* p. 933.
n. 37.

Linaria quadrifolia supina. C. BAUH. *Pin.* p. 213.

Linaria purpurea parva, foliis sine ordine dispositis.
BAUH. *Hist.* III. p. 416. RAIH *Hist.* 757.

PETAGN. *Infl. Bot.* III. p. 1152.

AIT. *Hort. Kew.* II. p. 335.

SCHKUHR *Bot. Handb.* II. S. 190. n. 1704.

Al-

ANTIRRHINUM ALPINUM.

*Alpium indigena stirps inhabitat scropulosa humen-
tia juga & torrentium alveos inter saxa*

Helvetiae

SCHEUCHZER *It. alp.* I. p. 42. *It. IV.* p. 338.

HALL. *Hist. stirp. helv.* I. p. 146. n. 338. No-
mencl. n. 338.

Germaniae

CRANTZ *stirp. Austr.* II. p. 306.

JACQUIN *Fl. Austr.* I. p. 36. t. 58.

SCHRANK *Bai. Fl.* II. S. 166. n. 955.

PRIMIT. *Fl. Salisb.* p. 161. n. 592.

REINER u. HOHENWARTH *bot. Reisen.* S. 15. 32.
38. 50.

HOST *Syn. pl. Austr.* p. 345.

†

SCOP. *Carn. ed. 2.* I. p. 442. n. 767.

††

KROCK. *Siles.* n. 991.

Italiae

SEGUIER *pl. Veron.* I. p. 263.

ALLION *Pedem.* I. p. 66. n. 241.

Hispaniae

DEL ASSO in ROEMER *Script. de plant. Hisp.* &c.
p. 26. n. 129.

Galliae

VILLARS *Hist. des plant. du Dauph.* II. p. 438.

LAMARCK *Fl. Franç.* II. p. 345.


Flo-

ANTIRRHINUM ALPINUM.

Floret Julio & Augusto. O.

Pulchrae plantulae *Radix* multicaulis, debilis, saepe non sufficit sustinendis caulis, qui basi procumbunt. *Caules* adscendentis, adscendendo crassiores, vix dodrantales, ramosi. *Folia* glauca, carnosa, linearia, quaterna in verticillo, etiam terna & quina; raro solum duo sibi opponuntur. Elegans densusque florum *racemus* caulem singulum terminat, quorum unita gravitate planta saepe deprimitur. *Corollæ* purpureo violaceae *labium superius* erectum, planum, fere semibifidum, inferiori longius; laciiniis oblongis & obtusis. *Inferius* patens & planum dividitur in tres lacinias subrotundas & aequales. Discus prominulus & fulcatus aureo colore conspicuus. *Calcar* subulatum acutum longumque leviter incurvatur. *Faux* ante discum villis obducitur, in fauce lineae duae disco concolores, quibus stamina majora incumbunt. *Filamenta* albida *Antheras* gerunt flavas, cohaerentes, luteo polline plenas. *Calycis foliola* linearia, acuta & subaequalia. *Capula* apice sexalvis semina includit nigra plana & marginata.





Ranunculus parnassifolius



RANUNCULUS PARNASSIFOLIUS.

Doldentragender Ranunkel. Parnassia - leav'd
Crowfoot.

Renoncule à feuilles de parnafsie.

Polyandria Polygynia.

CHAR. GEN. *Calyx* deciduus pentaphyllus (rarius triphyllus). *Petala* quinque (rarius duo, tria, aut octo) intra unguis squamula vel poro mellifero. *Styli* persistentes. *Semina* incrustata, erecta.

RANUNCULUS *parnassifolius* (* *foliis indivisis*) foliis subovatis nervosis lineatis integerimis petiolatis, floribus umbellatis.

LINN. *Spec. plant.* p. 774. n. 6. *Syst. Veg. ed. XIV.*

p. 515. *Syst. Nat. ex edit.* GMEL. p. 877.

Ranunculus montanus, graminis Parnassi folio.

TOURNEF. *inst. R. H.* p. 286.

AIT. *Hort. Kew.* II. p. 265.

SCHKUHR *Handb.* II. S. 110. n. 1495.

CURTIS *Bot. Mag.* n. CXXVII. p. 386.

Habitat in alpinis saxosis

Helvetiae

HALL. *Hist. fl. Helv.* II. p. 77. n. 1179? (Descriptio optime cum nostra planta convenit: Synonyma ad *R. amplexicaulem* L. pertinere videntur. Utraque certe species est Helvetiae indigena: ambas in Valesiae abruptis invenit oculatissimus THOMAS.)

Ger-

Germaniae

WULFEN in IACQ. *Collett.* Tom. I. p. 191. t. IX.
f. 3.

REINER und HOHENWARTH *Bot. Reisen* S. 190-193.
HOST *Syn. pl. Austr.* p. 309. n. 4.

Galliae

VILLARS *Hist. des plant. du Dauph.* III. p. 733.

LAMARCK *Flore Franç.* III. p. 186.

Aestate floret. 24.

Radix alba, rotundato-oblonga, plures emittens surculos longos, teretes, perpendiculares, simplices. *Imum caulem* ambeunt setae reticulatae. *Folia radicalia*, lanceolata, membranacea, supra terram eminentia. *Folia ova-ta*, obtusa, coriacea, nervosa, integerrima, supra pubescentia, in primis basi involuta, longius petiolata. *Caulis* (*scapus?*) spithamalis, erectus, teres, villosum, superne per intervalla multiflorus, foliis non aliter obseptus, quam quae bractearum ad instar, ad peduncularum floralium exortum, eidem adnascuntur absque petiolo, amplexicau-libus, ovato-lanceolatis, margine integerrimis, coriaceis, viridibus, inferne nervosis, calvis, superne levissim. substriatis, hirsutis. *Flos* magnus, quovis in pedunculo villoso, solitarius & terminalis. *Calyx* pentaphyllus, deciduus, foliolis ovatis, integerrimis, concavis, violaceo-rubentibus & pubescentibus. *Corolla* nivea, pentapetala, calyce duplo major; petalis obovatis, substriatis, basi-unguiculatis, foveolaque nectarifera notatis. *Stamina* numerosa, corollis multo breviora, filamentis subulatis albis, *antherae* flavae.



Orchis Sambucina

ORCHIS SAMBUCINA.

Ragwurtz mit dem Hollundergeruche.

Gynandria Diandria.

CHAR. GEN. *Calyx* (Corolla LINN.) pentaphyllus, coloratus, irregularis, superus, foliolis tribus exterioribus duobusque interioribus. *Corolla* monopetala bilabiata; *labio superiore* erecto brevissimo antheras per brevissima filamenta cum stylo conjunctas recipiente & tegente; *inferiore* magno, patulo, postice in calcar corniforme elongato. *Germen* inferum, tortum.

ORCHIS *sambucina*, calycis foliis lateralibus patentibus; corollae tubo incurvo, conico, apice emarginato; labio trilobo, crenulato; bracteis longitudine florum.

O. *sambucina* LINN. Sp. pl. p. 1334. n. 22. Synt. Veg. ed. XIV. p. 810. Synt. Nat. ex edit. GMEL. p. 53. Fl. Suec. ed. 2. p. 312. n. 803. Olansk. ref. p. 148.

O. *palmata* sambuci odore. C. BAUH. pin. p. 86.

RUDB. Elysf. II. 213. f. 9.

RAJ. Hist. 1224. n. 3. syllab. 192. n. 4.

Palmata sive Orchis Pannonica floribus exalbidis & alba Griesbachiana. Ioh. BAUH. Hist. II. p. 775. f. 4.

O.

O. *sambucina*. IACQ. *obs.* II. p. 31.

PETAGNAE *institut. bot.* IV. p. 1727. n. 36.

Fr. *Wilh. SCHMIDT orchid. in MAYER's phys. Auff.*
I. Th. p. 231.

Habitat in sylvis nemoribusque montosis humentibus

Helvetiae

O. *radicibus palmatis, bracteis coloratis, labello circumferrato, trilobato, lobo medio emarginato.* HALL. *Hist. stirp. Helv.* II. p. 142. n. 1280. β. *Nomenclat.* n. 1280.

Germaniae

ROTH *Tent. Fl. germ.* I. p. 378. II, 2. p. 389. cuius Synonymis adde:

SCHRANK *Bai. Fl.* I. §. 243. n. 77.

BAUMGARTEN *Fl. Lipf.* p. 14. n. 37. *Tab.* II.

HOST *Syn. plant. Austr.* p. 487. n. 14.

H. C. FUNK in RÖMER's *Archiv f. d. Bot.* I, 1. S. 40.

Hungariae

LÜMNITZER *Fl. Poson.* p. 402. n. 895.

Bohemiae

Fr. W. SCHMIDT *Fl. Boh. Cent.* I. p. 53. n. LXVII.

Galliae

VILLARS *Hist. des plant. du Dauph.* II. p. 36.

Italiae

Orchis *palmata lutea, floris labio maculato.* SEGUIER *Pl. Veron.* III. *Suppl.* p. 249. *Tab. VIII. fig. 5.*

O. *sambucina*. ALLIONE *Fl. Pedem.* II. p. 149. n.
1840.

Sueciae

LINN. *Fl. Suec.* l. c. β.

RETZII *Prodr. Fl. Scand.* ed. 2. p. 205. n. 1080. β.

LILIEBLAD *Svensk Flora.* p. 212.

Norvegiae

GUNNER *Fl. Norveg.* II. p. 30. n. CCCCXXVI.

Hispaniae

del ASSO in ROEMER *script. de plant. Hisp. &c.* p. 34.

Lituaniae

GILIBERT in USTERI *Delect.* II. p. 287.

Floret Majo & ineunte Iunio. Rarior. 2.

Radix, Bulbi duo, ovati, bipartiti, teretes, farinosi, pallide flaventes: *biennis* apice fibrillulis fortioribus, pollicaribus; *junior* magis conicus & apice nudus, obtusus. *Vaginae radicales* oblique truncatae. *Caulis* strictus, semipedalis & ultra, solidus, subangulosus, praesertim versus spicam. *Folia* alterna, oblongo-lanceolata, laete viridia; *radicalia* duo vel tria plerumque convoluta; *caulina* amplexicaulia, vaginantia, obsolete nervosa. *Spica* ovata, laxiuscula, speciosa. *Bracteae* lanceolatae, acuminate, longitudine florum, ex viridi flaventes. *Flores* ochroleuci, purpureis venis & punctis variegati, suaveolentes. *Calyx* folia lanceolata, acuta, flava, striata, duo exteriora lateralia expansa, reliqua in cucullum conniventia. *Corolla* labio inferiore latissimo, lateribus modicum reflexo, trilobo, erofo-crenulato; lobis rotundatis, medio minore;

cete-

ceterum flavo, venis & punctis purpureis picto. *Cornu* germinis longitudine conicum, incurvum, dependens, apice intumidum, emarginatum, subscrotiforme.

OBS. I. Variat Floribus livide purpureis.

II. Minus facile ab aliis speciebus distinguitur haec planta; dignoscenda Florum colore flavo in purpureum variante, loco montofo humente, tempore florandi praecociore quam ulla species Orchidis. Ab ORCHIDE *latifolia* distinguitur facile floribus paucis, Caule infra medium tantum folioso, bracteis floribus minime longioribus, Foliis nequaquam ex ovato lanceolatis, sed lingulatis fere ut in ORCHIDE *maculata* a qua facile distinguitur floribus rariss, labio non crenulato, cornu longiore, foliis immaculatis, radicibus minus divaricatis & toto habitu.

Contenta Fasciculi quarti.

Agrimonia agrimonoides LINN.

Erica daboecia LINN.

Chlora perfoliata LINN.

Adonis vernalis LINN.

Cypripedium calceolus LINN.

Antirrhinum alpinum LINN.

Ranunculus parnassifolius LINN.

Orchis sambucina. LINN.



F L O R A E U R O P A E A

I N C H O A T A

A

JOH. IAC. ROEMER

MED. ET CHIR. DOCT.


EORVNDEMQUE IN INSTITVTO MEDICO - CHI-
RVGICO QVOD TVRICI FLORET,
PROFESSORE.

SOCIETATIS MED. ET CHIR. PER HELVETIAM CORRE-
SPONDENTIVM E MEMBRIS PRAESIDI ADIVNCTIS. SOC.
PHYSICAE TVRICENS. MEMBR. ORDINARIO. ACAD. REG.
SCIENT. STOCKHOLMIENS. NATVRAE SCRVTATOR. BERO-
LINENS. HALLENS. ET IENENS. AGRARIAE VICENTINAE,
PRIVATAE GOETTINGENS. MEMERO HONO-
RARIO.



F A S C I C V L V S V.

NORIMBERGAE
EX OFFICINA RASPEANA
1800.



D A V. H E N R I C O
H O P P E

SOC. NAT. CUR. HALENS. GOETTINGENS. ET
IENENS. PHYSICAE TURICENS. BOTANICAE
RATISBONENS. MEMBRO.

BOTANICO INDEFESSO

QUINTUM
FLORAE EUROPEAE FASCICULUM

D. D. D.

I. I. R O E M E R.





Campanula Zoisii.



CAMPANULA ZOYSII.

Zoyf'ens Glockenblume.

Pentandria Monogynia.

CHAR. GEN. *Corolla campanulata, valvulis quinque staminiferis in fundo. Stigma trifidum. Capsula infera, evalvis, tri-vel quinquelocularis, poris lateribus dehiscens.*

CAMPANULA ZOYSII (**foliis laevioribus*) caulis subtrifloris; foliis radicalibus ovatis, longe petiolatis; caulinis oblongo-ovatis, sessilibus. WULFEN in *Iacq. Collect. II.* p. 122, 123. *Idem* in *Iacq. Ic. var. II.* t. 334.

LINN. S. N. *ex edit. GMEL.* p. 349. n. 26. *Spec. plant. c. WILLDENOW.* I. p. 891.

Habitat in alpibus

Carinthiae (e fissuris alpium Vochinenium, tum & in summitate montis Storchez)

Cel. WULFEN I. c.

HOST *Synops. p. 105.*

Radix horizontalis, gracilis, teretiuscula, ex albo subochracea, ad terrae superficiem cespitose ramosa, caulinos quotannis efferens plurimos, nonnullos foliosos, alios florigeros, duorum, triumve pollicum altitudine, graciles,

ciles, tereti-subangulosos, glabros, foliis alternis obsoitos, plerumque uni-, rarius bi- aut trifloros, erectos, floribus nutantibus. *Folia* copiosa, parva, saturate viridia, subtus pallidiora, crassiuscula, glabra, integerrima; *radicalia* subrotundo-ovata, longe petiolata; *caulina* alterna, oblongo-ovata, in petiolum velut decurrentia, sed re ipsa sessilia, summis, squamarum instar, linearis-acutis. *Flos* terminalis, unicus communiter, interdum & alter, tertiusve, proprio quisque suo de ramuli squamosi apice putans. *Calyx* superus, quinque partitus, corolla brevior, erecto patens, laciniis linearis-lanceolatis, glabris, subtus carinatis. *Corolla* plus minus coelestino-coerulea, lineis quinque saturationibus, rarius alba; monopetala, oblongo-campaniformis, basi impervia & ventricosior, limbum versus nonnihil coarctata, limbo ipso quinquefido, erecto-patente; laciniis ovato-acutis, margine barbato-villoso; villis longis, albis, ante plenam limbi explicationem, in pyramide pentagonam, supra corollae faucem conniventibus. *Stamina* quinque, corollis breviora; *filamentis* subulatis, albis, suae quovis valvulae pectiniformi ovato-fornicatae, & ipsi pater albae, infixo. *Antherae* oblongae, dilute flaventes. *Stylus* staminibus longior, filiformis, albus; stigma tripartito, crassiusculo, deorsum incurvo, papilloso, aquoso flavente. *Germen* inferum, ovato-turbinatum, rugosum, glabrum, viride. *Capula* angulata, superne ciliata, latere foraminibus tribus hians, trilocularis. W.



Campanula Trachelium.

1000*l.*



CAMPANULA TRACHELIUM.

Gemeine Glockenblume. Campanule gantelée.

Great, or Nettle-leaved Bell-flower.

Pentandria Monogynia.

CHAR. GEN. *Corolla campanulata, valvulis quinque staminiferis in fundo. Stigma trifidum. Capsula infera, evalvis, tri- vel quinquelocularis, poris lateralibus dehiscens.*

CAMPANULA *Trachelium (** foliis scabris latioribus)*
caule angulato, foliis petiolatis, calycibus ciliatis,
pedunculis trifidis. LINN. *Spec. pl.* I. p. 235.
Virid. cliff. 16. *Fl. Suec.* ed. I. 181. ed. 2. 189.
Syst. Veg. ed. XIV. p. p. S. N. *edit.* GMEL. p.
350. *Spec. pl.* ed. WILLDEN. I. p. 903.

LAMARCK *Encycl. Meth.* I, 2. p. 576.

PETAGNA *inflit. bot.* II. p. 362.

VITMAN *summa plant.* I. p. 446.

GILIB. *europ.* III. p. 213.

AIT. *Hort. Kew.* II. p. 80.

(THUNBERG *Fl. Iap.* p. 83.)

Rapum sylvestre alterum, Cervicaria major DODON.
coron. p. 31, 32.

Cervicaria major TABERNAEMONT. p. 412. & major
II. p. 413.

Trachelium majus fl. purpureo PARKINS. *parad.*
354. 4.

Campanula vulgatior foliis urticae, vel major & af-
terior. C. BAUH. *Pin.* p. 94.

Campanula major & asperior foliis urticae I. BAUH.
II. p. 805. f. 2.

CAMPANULA TRACHELIUM.

C. vulgat. fol. urt. v. maj. & asp. TOURNEF. *inst.*
p. 109.

C. foliis radicalibus cordatis, calycibus ciliatis. LINN.
Hort. cliff. p. 16.

*Nihil vulgatius ad sylvarum margines & in sepibus
Helvetiae*

HALL. *Hist. pl. Helv.* n. 690.

Germaniae

ROTH *Tent. Fl. Germ.* I. p. 100. II, I. p. 255.

Cujus Synonymis adde:

SCHRANK *Bai. Fl.* I. n. 334.

SCHKUHR *bot. Handb.* I. S. 127. n. 415.

SCHRANK *primit. Fl. Salisb.* p. 71. n. 218.

MÖNCH *method.* p. 495.

HOST *Synops. plant. Austr.* p. 108.

†

SCOP. *carn.* ed. II. T. I. p. 148.

††

MATTUSCHKA *Fl. Siles.* 179.

KROCKER *Siles.* n. 316.

Bohemiae

SCHMIDT *Fl. Bohem.* Cent. II. p. 75. n. CLXXVI.

Hungariae

Trachelium foliis Urticae clus. *Pann.* p. 687.

LUMNITZER *Fl. Poson.* p. 83. n. 208.

Galliae

MAGNOL. *Bot. Monsp.* p. 45.

GARIDEL *Hist. des pl. aux env. d'Aix.* Tab. XIX.

VAILLANT *Bot. Paris.* p. 26.

DALIBARD *Fl. Paris. prodr.* p. 66.

COUAN *Fl. Monsp.* p. 25. *Hort. Monsp.* p. 97.

CAMPANULA TRACHELIUM.

VILLARS *Fl. Delph.* II. p. 507.

BULLIARD *Herb. de la France* tab. 319.

LAMARCK *Fl. franç.* III. p. 335.

Angliae

RAII *Synops.* p. 276.

HUDSON *Fl. Engl.* ed. 2. p. 96.

RELIAN *Fl. Cantabr.* p. 94. n. 180.

MILNE'S & GORDON'S *Indigenous Botany* I. p. 337.

SOWERBY'S *Engl. Bot.* IV. n. 12.

SIBTHORP *Fl. Oxon.* p. 80. n. 249.

WITHERING'S *Bot. Arrang.* edit. 3. II. p. 243.

Scotiae

LIGHTFOOT *Fl. Scot.* I. p. 142.

Italiae

UVULARIA del Trago PONA *Monte Baldo.* (4. Venet. 1617.) p. 139.

SEGUIER *Pl. Veron.* I. p. 175.

SABBATI *Hort. Rom.* I. tab. 73.

ALLIONE *Fl. Pedem.* I. p. 111. n. 410.

ab UCRIA *Hort. Panorm.* p. 93.

CAMP. *urticifolia* TURRA *Prodr. Fl. Ital.* p. 64, n. 9. an ab hac specie satis distincta?

Hispaniae

del ASSO *Synops.* n. 179.

Belgii

de GORTER *Fl. VII. Provinc.* p. 59. n. 197.

Daniae

Fl. Dan. Tab. 1026.

Otto Frid. MÜLLER *Fl. Friedrichsdal.* p. 42. n. 175.

RETZII *Fl. Scand.* *prodr.* edit. 2. p. 57. n. 262.

Sueciae

LINN. *Fl. Suec.* ed. 2. p. 67. n. 189.

LILJEBLAD *Utkast til en Svensk Flora.* p. 89.

Rof-

Rossiae

SIEGESBECK *Primit. Fl. Petrop.* p. 23.

STEPHANI *Enumerat. stirp. agr. Mosq.* p. 10.

Floret Julio & Augusto. 4


Caulis subangulatus, hirtus, simplex, bipedalis & ultra, nutans. *Folia inferiora* petiolata, cordata, *superiora* ovato-lanceolata, in petiolum brevem decurrentia; *summa* lanceolata, subsessilia; omnia inaequaliter ferrata, utrinque scabra. *Pedunculi* ex alis foliorum superiorum, erecti, uniflori, biflori & triflori, bipollicares. *Pedicelli* brevissimi. *Calyx* totus hispidus. *Corolla* pentagona, extus hispida, limbo lanuginoso, coerulea.

Variat 1. flore albo &
violaceo.

2. Pedunculis imis trifloris, supremis unifloris.

OBS. I. Varietati *Pedunculis unifloris* est *caulis* minus angulatus, & subteres. *Folia* omnia subcordata, asperiora, dentata. *Pedunculi* omnes uniflori; flore longiores. SCOP.

II. Cum in *CAMPANULA latifolia* L. subinde pedunculi biflori, in *trachelium* uniflori observentur; cum *CAMPANULAE trachelium* calyx saepius absque omni hispiditate inveniatur, characteres Linnaeani distinguendis duabus hisce speciebus vix sufficient. At si ad *caulis* angulos membranaceos & foliorum diversitatem attendas, minus difficulter distinguuntur ambae.



Galanthus nivalis.

GALANTHUS NIVALIS.

Schneeglöckchen. Galant d'hiver. Common
Snow-drop.

Hexandria monogynia.

CHAR. GEN. *Petala tria exteriora concava: interiora nectarifera tria breviora emarginata. Stylus simplex.*

GALANTHUS *nivalis*.

LINN. Sp. pl. p. 413. Syst. Veg. ed. XIV. p. 316.

Syst. Nat. ex edit. GMEL. p. 534. Hort.

Cliff. p. 134. Hort. upf. 74.

Leucoium bulbosum trifolium minus. C. BAUH. Pin.
p. 56.

Evangelia. RENEAL. Spec. 97. t. 96.

Galantine nivale. LAMARCK Enc. meth. II, 2. p. 584.

G. *nivalis* AIT. H. Kew. I. p. 406.

Habitat ad radices montium, in sylvis, pratis umbrosis

Helvetiae

HALL. Hist. Stirp. Helv. II. p. 124. n. 1254. No-
mencl. n. 1254.

Germaniae

ROTH Tent. Fl. germ. I. p. 144. II, 2. p. 378. cu-
jus Synonymis adde:

SCHRANK Bai. Fl. I. S. 586. n. 518.

GALANTHUS NIVALIS.

- BAUMGARTEN *Fl. Lips.* p. 178. n. 462.
MÖNCH *Method. pl. Marburg.* p. 650.
HOST *Synops. pl. Austr.* p. 182.
BORKHAUSEN *Rhein. Mag. I. S. 564. Oberkattische Flora.* I. S. 183. n. 289.
STURM *Deutschl. Flora I, 2.* n. 6.

Bohemiae

- SCHMIDT *Fl. Bohem. Cent.* III. p. 14. n. 313.

Pannonicæ

- LUMNITZER *Fl. Poson.* p. 133. n. 322.

Galliae

- LAMARCK *Flore françoise* III. p. 500. n. 1100.

Italiae

- SEGUIER *plant. Veron.* II. p. 73.

- ALLIONE *Fl. Pedemont.* II. p. 155. n. 1866.

- PETAGNAE *inst. bot.* II. p. 587.

Angliae (est adhuc in dubio an vere indigena regni sit.)

- HUDSON *Fl. Engl.* p. 140.

- WITHERING'S *bot. Arrang.* (3d. Edit.) II. p. 331.

- SOWERBY'S *Engl. bot.* VII. n. 19.

Floret Februario- Aprilem. Semina matura fert Iunio. 2.

Radix bulbus subrotundus tunicatus, carnosus, extus fuscenscentibus tunicis vestitus, infra fibris capillatus; ex illo

GALANTHUS NIVALIS.

illo vagina monophylla, membranacea, diaphana, albida, apice truncata affurgit, quae folia & scapum includit. *Scapus* a basi ad spatham usque anceps, subfistulosus, glaucus, glaber, unillorus, florens erectus, fructescens prostratus & marcescens. *Folia* duo ex radice, linearia, basi vaginantia, apice callosa ac incrassata, extus nervo eminente notata, supra carinata, glauca, glabra, longitudine scapi. *Spatha* longa constat ex duobus foliolis linearibus, crassis, excavatis, apice callosis, membrana diaphana alba utrinque conjunctis. Interne, ubi pedunculus prodit usque ad medium membrana fnditur. *Pedunculus* teres, gracilis, decurvatus, ac subinde florem nutantem gerens. *Corolla* hexapetala, inaequalis. *Petala* tria exteriora oblonga, obtusa, lineis striata, alba, patentissima, internis duplo longiora; tria interiora alternantia, concava, obcordata, emarginata, in tubum erecta, carnosa, albida, extus macula viridi cordata picta, intus sex lineis obsolete luteis striata. *Stamina* oriuntur ex sex foveolis germini insculptis, neectariferis. *Filamenta* brevia alba. *Antherae* flavae, magnae, in acumen tenuissimum elongatae, conniventes, & apicibus dehiscentes. *Germen* obsolete triquetrum, obtusangulum, glabrum. *Stylus* simplex, filiformis, staminibus longior. *Stigma* simplicissimum. *Capula* subrotunda, obtusa, trilocularis in tres valvulas dehiscens. In singulo loculo femina a quinque ad decem, ovata, albida, nitida.





Scilla bifolia



SCILLA BIFOLIA.

Zweyblättrige Squille. Squille double feuille.
Two-leaved Squill.

Hexandria Monogynia.

CHAR. GEN. *Corolla 6-petala, potens, decidua. Filamenta filiformia.*

SCILLA *bifolia* floribus racemosis, foliis lanceolato-linearis subbinatis in scapo elevatis. AIT. Hort. Kew. I. p. 144.

Sc. *bifolia* LINN. Sp. pl. p. 443. n. 6. Syst. Veg. edit. XIV. p. 329. Syst. Nat. ex edit. GMEL. p. 552. n. 12. Hort. Cliff. p. 123.

Hyacinthus coeruleus mas minor. FUCHS. Hist. p. 837.

Hyacinthus stellatus, bifolius vernus dumetorum, flore coeruleo. BAUH. Hist. II. p. 679.

Hyac. stellaris bifolius germanicus. C. BAUH. pin. p. 45.

Ornithogalum *bifolium*. NECKER in Att. palat. II. p. 46.

Stellaris *bifolia*. MOENCH Method. plant. Marb. p. 304.

Sc. *bifolia* RETZII Obs. VI. p. 27.

PETAGNA Inst. bot. III. p. 623.

SCHKUHR Bot. Handb. I. p. 288. n. 868.

Habitat in pratis & sylvaticis

Helvetiae

C. BAUH. Cat. plant. circa Basil. p. 19.

Phalangium radice bulbosa, foliis latissimis, obtusis, spica pauciflora, stipulis minimis. HALL. Hist. stirp. Helv. II. p. 101. n. 1211. Nomencl. n. 1211.

Germaniae

IACQ. Fl. austri. II. p. 11. tab. CXVII.

SCHRANK Bay. Fl. I. p. 597. n. 535. Fl. salisb. p. 95. n. 311.

HOFFMANN *Fl. germ.* p. 120.

HOST *Synops.* p. 191.

WIBEL *Primit.* p. 217. n. 258.



Anthericum bifolium. SCOP. *Fl. Carn.* I. p. 247.

Bohemiae

SCHMIDT *Fl. Bohem.* Cent. III. p. 46. n. CCCXLIV.

Pannoniae

LUMNITZER *Fl. Poson.* p. 141. n. 340.

Galliae

VILLARS *Fl. Delphin.* II. p. 264.

LAMARCK *Fl. franç.* III. 274. (*Ornithogalum bifolium*).

Italiae

Giacinto germanico con fior di Giglio. PONA monte Baldo. p. 68.

SEGUIER *Pl. Veron.* II. p. 68.

ab UCRIA *H. Panorm.* p. 156.

ALLIONE *Fl. Pedem.* II. p. 163. n. 1895.

Sueciae

RETZII *Prodr. Fl. Scand.* Edit. 2. p. 77. n. 404.

Daniae

Fl. Dan. tab. 568.

Norvegiae

GUNNER *Fl. Norveg.* II. p. 139. n. MLXVIII.

Angliae

SOWERBY'S *Engl. Bot.* VIII. n. 24.

WITHERING'S *Arrang.* Edit. 3. II. p. 338.

Scotiae

LIGHTFOOT'S *Fl. Scot.* I. p. 181.

Martio floret & Aprili: semina matura perficit Majo. 2

Scapus palmaris, erectus, striatus, 4-6, rarius 10
florus. Folia 2 carinata, striata, apicibus callosis. Flores
coerulei, breviter pedunculati, bracteis vix conspicuis.
Petala alterna albo tuberculo terminata. Antherae trans-
versae, polline ex viridi cinereo. Filamenta infra medium
alba, dein caerulea. Germen ovatum, lineis 6 albis striatum.



Dianthus caryophyllus

DIANTHUS CAESIUS.

Bergnelke. Mountain-Pink.

Decandria Digynia.

CHAR. GEN. *Calyx cylindricus, monophyllus: basi squamis quatuor. Petala 5 unguiculata. Capsula cylindrica monolocularis.*

DIANTHUS *deltoides* (***caule unifloro herbaceo*) caulis subunifloris, squamis calycinis subrotundis brevibus, petalis crenatis pubescentibus, foliis margine scabris. SMITH in *Linn. Transact.* II. p. 302.

DIANTHUS *virgineus* β . LINN. *Sp. pl.* p. 590. D. *caesius* *Sp. pl. ex edit.* Willdenow p. 682.
Tunica rupestris, folio caesio molli, flore carneo.
DILLEN. *Hort. Eltham.* 401. t. 298. f. 385.

Habitat in montosis

Helvetiae

annuente DAVALL. V. Smith l. c.

Angliae

Armeriae species, flore in summo caule singulari,
RAII Syn. p. 336.

D. *glaucus* HUDSON *Fl. Engl.* p. 185.

D. *caesius* WITHERING's *bot. Arrang.* (3d. Edit.) II.
p. 411.

SOWERBY's *engl. Bot.* XXI. n. 62.

Floret Iulio & Augusto, amat solum siccum & sabulo-
sum. 24.

Radius

DIANTHUS CAESIUS.

Radix lignosa. Caules plures, spithamei, erecti, simplices, glabri, quadranguli, conjugationibus foliorum duabus vel tribus, uniflori, vix unquam biflori. *Folia* linear-lanceolata, obtusiuscula, glauca, margine scabra. *Calyx* squamae tubo triplo breviores, ovato-subrotundae, obtuse mucronatae, striatae. *Petala* carnea, obtuse dupl-cato-crenata, basi lineata atque barbata. SMITH l. c.



Aster tripolium

Fod x



ASTER TRIPOLIUM.

Meersternblume. Astere maritime. Sea-Starwort.

Syngenesia Polygamia superflua.

CHAR. GEN. *Calyx imbricatus*; squamis inferioribus patulis: receptaculum nudum; *pappus capillaris*.

ASTER *Tripolium*, foliis linear-lanceolatis integerrimis carnosis glabris, trinerviis, foliolis calycinis submembranaceis obtusis.

A. *Tripolium* LINN. *Sp. pl.* p. 1226. n. 9. *S. Veg.* ed. XIV. p. 761. *S. Nat. ex edit.* GMEL. p. 1232. n. 18. *Fl. Suec.* ed. I. n. 697. ed. 2. n. 753.

Aster maritimus *Tripolium dictus*. RAJ. *Hift.* p. 270. n. 20. LINN. *Hort. Cliff.* p. 408.

Tripolium majus caeruleum. C. BAUH. *pin.* p. 267.
MORISON *Hift.* 121. n. 37. f. 7. t. 22. f. 36.

PETIV. *Herb.* t. XVII. f. 10, II.

Aster maritimus, *palustris caeruleus*, *salicis folio*.
TOURNEF. *infl.* p. 481.

AITTON *Hort. Kew.* III. p. 199. n. 9.

LAMARCK *Enc. method.* I. p. 300. n. 9.

ASTER TRIPOLIUM.

Habitat in littoribus maritimis & ad lacus salbos

Germaniae

ROTH *Tent. Fl. germ.* I. p. 366. II, 2. p. 350. Cujus Synonymis adde:

BAUMGARTEN *Fl. Lips.* p. 472. n. 1125.

HOST *Syn. Pl. Austr.* p. 462.

Hungariae

LUMNITZER *Flora Posoniens.* p. 376. n. 842.

Galliae

GOUAN *Hort. Monsp.* p. 363.

VILLARS *Fl. Delphinat.* III. p. 221.

A. palustris LAMARCK *Fl. franç.* II. p. 143.

Belgii

de GORTER *Fl. VII. provinc.* p. 221. n. 689.

Italiae

ALLIONE *Fl. pedem.* I. p. 193. n. 701.

Lusitaniae

VANDELLI in ROEMER *Script. de plant. Hisp. &c.*
p. 144.

Daniae

Fl. Dan. tab. 615.

Sueciae

LINN. *Fl. Suec.* n. 697. edit. 2. n. 753.

RETZII *Prodr. Fl. Scand.* ed. 2. p. 195. n. 1023.

LILIEBLAD *Utkast* p. 288.

Ang.

ASTER TRIPOLIUM.

Angliae

RAII *Syn.* p. 175.

HUDSON *Fl. angl.* p. 368.

RELHAN *Fl. Cantabr.* p. 318. n. 617.

SOWERBY *engl. Bot.* XXVII. n. 87.


WITHERING'S *Bot. Arr. Ed.* 3. p. 726.

Scotiae

LIGHTFOOT *Fl. Scot.* I. p. 482.

Floret a Iunio ad serum autumnum. 24.

Caulis erectus sesquipedalis bipedalis & major, valde ramosus, ramis inferioribus longioribus, fulcatus, glaber. *Folia* glabra, integerrima, carnosa: *radicalia* ovata, obtusa, petiolis canaliculatis insidentia: *caulina* alterna; *inferiora* ovato-lanceolata, subpetiolata; *superiora* lanceolata, sessilia. *Rami* corymbosi terminantur pedunculis ramosis, 1-2 phyllis, unifloris. *Calyx* hemisphaericus. *Squamae calycinae* ovatae, obtusae, spadiceae. *Ligulae radii* angustae, caeruleae. *Discus* flavus. *Stigmata* flava, spathulata, apice conniventia.





Orchi militaris.

Dodal sc.



ORCHIS MILITARIS.

Graues Knabenkraut. Orquis militaire.
Man Orchis.

Gynandria Diandria.

CHAR. GEN. *Calyx* (Corolla LINN.) pentaphyllus, coloratus, irregularis, superus, foliolis tribus exterioribus duobusque interioribus. *Corolla* monopetala bilabiata; *labio superiore* erecto brevissimo antheras per brevissima filamenta cum *stylo* conjunctas recipiente & tegente; *inferiore* magno, patulo, postice in calcar corniforme elongato. *Germen* inferum, tortum.

ORCHIS *militaris* (** *Bulbis indivisis*) calyce monophyllo cucullato; corollae tubo obtuso brevi; labio quinquefido dupli punctata linea variegato.

O. *militaris* LINN. *Sp. pl.* p. 1333. n. 19. *Syst. Veg.* ed. XIV. p. 809. *S. Nat. ex edit.* GMEL. p. 52. n. 24. *Act. Upsal.* 1740. p. 11. *Oestlansk. Ref.* p. 45. *Fl. Suec. edit.* 1. n. 725. *edit.* 2. n. 796.

Cynosorchis latifolia, hianti cucullo major. c. BAUH. *pin.* p. 80.

Orchis galea & alis cinereis. Ioh. BAUH. *Hift.* II. p. 755.

HALLER *Gen. Orchid.* n. 22.

ORCHIS MILITARIS.

O. *Rivini*, radicibus subrotundis, spica conica, petalis conniventibus,nectarii labio trifido, lacinia media productiore bifida. GOUAN *Ilustr.* p. 74.

PETAGNAE *instit.* bot. IV. p. 1724. n. 26.

Fr. *Wilib.* SCHMIDT *orchid.* in MAYER's *phys. Auff.* I. Th. p. 225.

Incolit prata sylvatica humida

Helvetiae

O. radicibus subrotundis, spica conica, labello quadrifido, brachiolo & pectore perangustis. HALL. *Hist. stirp. Helv.* H. p. 140. n. 1277. Tab. XXVIII. *Nomencl.* n. 1277.

Germaniae

ROTH *Tent. Fl. Germ.* I. p. 377. II, 2. p. 383. cuius Synonymis adde:

SCHRANK *Bai. Fl.* I. S. 241. n. 72. (O. cinerea.)

BAUMGARTEN *Fl. Lips.* p. 17. n. 43.

HOST *Syn. pl. Austr.* p. 486. n. 11.

Hungariae

LUMNITZER *Fl. Poson.* p. 401. n. 893.

Bohemiae

Fr. w. SCHMIDT *Fl. Bohem. Cent.* I. p. 45. n. LIX.

Galliae

LAMARCK *Fl. franç.* III. p. 506.

(Cf. VILLARS *Hist. des plant. du Dauph.* II. p. 32-35.)

An-

ORCHIS MILITARIS.

Angliae

Orchis galea & alis fere cinereis. RAI^I *Synops.* p. 378.

HUDSON *Fl. Engl.* p. 384.

SOWERBY'S *Engl. Bot.* VI. n. 16.

WITHERING'S *Arrang.* Edit. 3. II. p. 25.

SIBTHORP *Fl. Oxon.* p. 10. n. 28.

Floret Majo & Iunio. 24.

Radix bulbi duo ovati, farinosi, pallide flaventes. *Vaginae* radicales oblique truncatae, lacerae. *Caulis* strictus, teres, versus spicam angulosus, uno altero ve folio vaginante vestitus. *Folia* radicalia lato-lanceolata, acuminate, ad basin vaginantia, canaliculata. *Spica* cylindrica, densa, speciosa. *Bracteae* fuscae, exiguae. *Flores* pallide purpurei. *Calyx* monophyllus, acutus, apice trifidus, in cucullum connivens, liliaceus, striatus. *Corollae* labium inferius dependens, planum, speciosum, purpureum, medio albidum & violaceis punctis in duabus lineis longitudinalibus variegatum; quinquefidum, laciniis superioribus in angulum subrectum expansis, inferioribus patentibus, obtusis; intermedia angustiore, minore, acuta. *Cornu* medium germen adaequat, dependens, obtusum.



Fucus sanguineus

FUCUS SANGUINEUS.

Rothblättriger Tang. Dock-leaved Fucus.

Cryptogamia. Algae aquatice.

CHAR. GEN.

MASC. *Vesiculae* villis intertextae.

POEM. *Vesiculae* adspersae granis immersis apice prominulis. *Sem. solitaria.* LINN.

Globuli carpomorphi, vel semina graniformia sub punctis perforatis latentia. I. Fr. GMELIN in sua *Systematis Naturae Linneani editione.*

Semina, tuberculis confertis apice dehiscentibus, innata.

GOODENOUGH & WOODWARD.

OBS. Quamvis generis hujus *Character essentialis* utique manus sit, tamen meliorem in medium proferre non valamus, cum partes fructificationis plurimarum specierum adhucdum sint ignotae. Hactenus Fucorum genus e variae formae plantis marinis compositum est; quarum aliae habitu & structura nodosa ad Confervas accedunt, aliae Ulvas membranaceas aut gelatinosas mentiuntur, aliae tandem, texturae coriaceae, ab ambabus sat sunt distinctae. Si ex Observationibus celeberrimerum Anglorum, qui nuper Fucorum genus illustrare summa industria adnisi sunt conjecturare licitum sit, appareat, Fucus coriaceos duo distincta formare genera, reliquos in tria vel plura fore distinguendos.

FU-

FUCUS *sanguineus* frondibus membranaceis ovato-oblongis integerrimis petiolatis, caule tereti ramoso.
LINN. *Mant.* I. p. 136.

Syst. Veg. ed. XIV. p. 970.

S. N. ex edit. GMEL. p. 1387.

GMELIN *Hist. Fucor.* p. 185. *Tab. XXIV. fig. 2.*

PETAGNAE *inflit. bot.* Tom. V. p. 2100.

Fucus sive Alga folio membranaceo purpureo, Lathami sanguinei figura et magnitudine. MORRISON *Hist. Oxon.* III. p. 645. f. 15. tab. VIII. fig. 6.

Habitat in rupibus & saxis marinis

Angliae

RAII *Synops. edit.* III. p. 47. n. 35.

HUDSON *Fl. Engl.* ed. I. 475. ed. 2. 573.

WITHERING *Bot. Arr. ed. 3.* Vol. IV. p. 94.

STACKHOUSE'S *Nereis Brittan.* Fasc. I. p. 20, 21.

GOODENOUGH & WOODWARD *Obs. on the British Fuci* in Linn. *Transact.* Vol. III. p. 109-III.

Scotiae

LIGHTFOOT *Fl. Scot.* Vol. II. p. 942.

Sueciae

RETZII *Prodr. Fl. Scand. Edit. 2.* p. 300. n. 1711.

LILIEBLAD'S *Utkast* p. 345. n. 13.

Daniae (*Islandis Oaetess föl*).

Fl. Dan. Tab. CCCXLIX.

Norvegiae (*Norveg. Bloföld*).

GUNNER *Fl. Norveg.* Pars II. p. 91. n. DCCLII.


Ad-

Adhaeret rupibus callo solido difformi.

Frons semipedalis, etiam pedalis, purpurea, diaphana. *Caulis* brevis, teres, pro magnitudine plantae variat, nunc crassitiem pennae corvinae, nunc anserinae minoris æquans; modo semel, modo bis iterumve ramosus, ligneus, nodosus, atro-rubens. *Rami* petiolorum funguntur vice, & *foliis* membranaceis, tenerrimis, simplicibus, ovato-oblongis, obtusis, margine elegantissime undulatis, rosaceis, sanguineis, subinde & gilvo variegatis, terminantur. *Folium* nervus crassiusculus percurrit, aliis minoribus oppositis vel alternis ramosis, pinnatus: nonnunquam e nervo primario petiolus prodit, folium alterum quasi proliferum formans. *Fructificatio* tubercula sphaerica pedunculata, atro-purpurea, in petiolis rarius in nervis foliorum sita.

Fig. a. Segmentum petioli magnitudine naturali.
b. lente auctum.

OBS. Magnitudine & pulchritudine foliorum *F. sanguineus* palmam obtinet inter plantas submersas. Perraro autem illaesus & integer, imo vix unquam, nisi penitus dilaceratus obseruandum fese praebet. Diebus Halcyoniis quaerenda est haec species; membrana enim folii, quavis cuticula tenuior, simplici maris aestu facillime disrumpitur. A forma foliorum *Lapathi sanguinei marini* nomen olim obtinuit. D. BORLASE, in Hist. Cornubiae *F. sensitivum* appellat; folia enim exsiccata, tacta manu recedunt, & vi quadam elastica trepidant. STACKHOUSE.



CONTENTA FASCICULI QUINTI.

Campanula Zoypii WULF.

..... **Trachelium LINN.**

Galanthus nivalis LINN.

Scilla bifolia LINN.

Dianthus caesius SMITH.

Aster Tripolium LINN.

Orchis militaris LINN.

Fucus sanguineus LINN.



F L O R A E U R O P A E A

I N C H O A T A

A

JOH. JAC. ROEMER

MED. ET CHIR. DOCT.

EORVNDEMQUE IN INSTITVTO MEDICO - CHI-
RVNGICO QVOD TVRICI FLORET,
PROFESSORE.


SOCIETATIS MED. ET CHIR. PER HELVETIAM CORRE-
SPONDENTIVM E MEMBRIS PRAESIDI ADIVNCTIS. SOC.
PHYSICAE TVRICENS. MEMBR. ORDINARIO. ACAD. REG.
SCIENT. STOCKHOLMIENS. NATVRAE SCRVTATOR. EERO-
LINENS. HALLENS. ET IENENS. AGRARIAE VICENTINAE,
PRIVATAE GOETTINGENS. MEMERO HONO-
RARIO.



FASCICVLVS VI.



NORIMBERGAE
EX OFFICINA RASPEANA
1801,



G. F R. H O F F M A N N
M. D.

IN ACADEMIA GOETTINGENSI PROFESSORI
CET.

SEXTUM
FLORAE EUROPAEAE FASCICULUM

SACRUM ESSE VOLUIT

I. I. R O E M E R.





Festuca duriuscula

FESTUCA DURIUSCULA.

Harte Schwingel. Fetuque duréte. Hard Fes-
cue-grass.

T r i a n d r i a D i g y n i a.

CCHAR. GEN. *Spicula oblonga teretiuscula; calyx bi-*
valvis multiflorus: gluma exteriore in acumen
terminata.

FESTUCA duriuscula (**panicula secunda*) *panicula se-*
cunda oblonga, spiculis sexfloris oblongis laevi-
bus, foliis setaceis. LINN. *Spec. pl.* p. 108.
n. 3. *Syst. veg. ed. XIV.* p. 118. S.N. *ex edit.*
GMEL. p. 186. n. 6.

Gramen pratense, *panicula duriore laxa unam par-*
tēm spectante. RAIH *Hist.* p. 1285. n. 9.

Gramen tenue duriusculum & pene junceum. BAUH.
Hist. II. p. 463. Excl. Icone.

Gramen foliolis junceis minus. C. BAUH. *pin.* p. 5.
SCHEUCHZ. *Agrostogr.* p. 285.

F. panicula nutante inferne ramosa, spicis adscen-
dentibus hispidis, foliis setaceis. ROYEN
lugdb. p. 68.

F. panicula secunda oblonga stricta, spiculis subqua-
drifloris laevibus breviter aristatis, foliis an-
gustis complicatis rigidiusculis. LAMARCK
Enc. II. p. 455.

AITON Hort. Kew. II. p. 107.

Habitat in pratis siccis

Heb.

FESTUCA DURIUSCULA.

Helvetiae

HALLER *Hist. fl. Helv.* II. p. 214. n. 1437.

Germaniae

ROTH *Tent. Fl. Germ.* I. p. 45. II, 1. p. 126.

cujus Synonymis adde:

SCHRANK *Bai. Fl.* I. S. 353. n. 222.

SCHKUHR *Bot. Handb.* I. S. 45. n. 152.

MOENCH *Method. pl. Marburg.* p. 189.

HOST *Synops. pl. Auflr.* p. 52.

†

KROCKER *Siles.* n. 154.

Hungariae

LUMNITZER *Fl. Poson.* p. 41. n. 99.

Italiae

ALLIONE *Fl. Pedem.* II. p. 252. n. 2243.

Galliae

VILLARS *Fl. Delph.* II. p. 98.

LAMARCK *Fl. franç.* III. p. 601.

Belgii

de GORTER *Fl. VII. provinc.* p. 27. n. 96.

Angliae

RAII *Synops.* ed. 3. p. 413. Tab. XIX. f. 1.

HUDS. *Fl. Engl.* p. 44.

RELHAN *Fl. Cantabrig.* p. 40. n. 77.

SIBTHORP *Fl. Oxon.* p. 44. n. 139.

SOWERBY'S *Engl. Bot.* LXXX. n. 470.

WITHERING'S *Arrang.* ed. 3. II. p. 153.

Scotiae

LIGHTFOOT'S *Fl. Scot.* I. p. 101.

Da-

FESTUCA DURIUSCULA.

Daniae

Fl. Dan. t. 848.

†

RETZII Prodr. Fl. Scand. ed. 2. p. 24. n. 130.

Floret Iunio & Julio. 24.


Culmus pedalis & altior, erectus, teres, striatus, glaber. *Folia* setacea, fulco exarata; *caulina* duo vel tria breviora. *Vaginae* glabrae. *Ligula* brevis, fusca. *Panicula* digitalis, & major, secunda, angusta, subnutans. *Pedunculi* solitarii, firmi. *Spiculae* oblongae, compressae, sub florescentia distichae, adscendententes. *Glumae* inaequales, sexflorae dorso scabiae; exterior major, lanceolata, mucronata, longitudine valvulae corollae exterioris. *Corollae* dorso versus apicem scabriuscule, apice breviter aristatae.

Variat 1. Foliis radicalibus setaceis & filiformibus scabriusculis, caulinis planis & canaliculatis, nudis.

2. Spiculis a quatuor ad decem floris; glabris & pubescentibus.

OBS. A FESTUCA ovina differt: 1. Culmo tereti. 2. Panicula longiore angustiore. 3. Spiculis in aristam brevem terminatis.

A FESTUCA rubra differt: 1. Foliis culmeis aequo ac radicalibus setaceis. 2. Panicula contractiore. 3. Spiculis minoribus, ovatis, brevissime aristatis.





Bromus erectus.

G. Engel sc.



BROMUS ERECTUS.

Aufrechte Trespe. Upright Brome-grass.

Triandria Digynia.

CHAR. GEN. *Calyx bivalvis. Spicula oblonga, disticha: aristा infra apicem: gluma interior pectinato - ciliata.*

BROMUS *erectus*, panicula erecta; pedunculis subsimpli-cibus, flosculis lanceolatis, teretiusculis, foliis radicalibus angustissimis ciliato-pilosis. SMITH in *Linn. Transact.* Vol. IV. p. 290.

Gramen *bromoides pratense*, foliis praeter culmum angustissimis, rara lanugine villosus. SCHEUCHZ. Agr. 255. t. V. f. 13. Ad exemplar siccum ab ipso Scheuchzero Sherardo dono datum.

G. *bromoides paniculatum*, foliis & culmo villosis. SCHEUCHZ. Agr. p. 257. ex opinione Gerardi.

G. *avenaceum glabrum*, panicula purpureo-argentea splendente. MOR. Vol. III. p. 213. n. 20.

G. *loliaceum*, loculis longis aristatis. MONT. *Prodr.* 35. f. 2.

G. *sparteum*, longa & spicata panicula, Lolii utriculitis, Festucae potius, majus. BARREL. Ic. t. XIII. f. 1.

Ha.

BROMUS ERECTUS.

Habitat in pascuis arenosis, creta substratis

Helvetiae

HALL. *Hist. stirp. Helv.* II. p. 237. n. 1507. Non
mencl. n. 107.

Galliae

TOURNEF. *plant. des env. de Paris* II. 374.

VAILLANT *Paris.* p. 93. tab. XVIII. f. 2.

B. perennis VILLARS *Fl. Delphinat.* II. p. 122.

Italiae

B. agrestis ALLIONE *Fl. Pedem.* II. p. 249. n. 2224.

Angliae

Festuca avenacea sterilis spicis erectis. RAI Syn.
ed. 1. p. 237. ed. 2. p. 261. ed. 3. (exclusis synonymis) p. 413.

B. erectus HUDS. *Fl. angl.* ed. 1. p. 39. ed. 2. p. 49.

RELHAN *Fl. Cantabrig.* Suppl. 2. p. 8.

SIBTHORP *Fl. Oxon.* p. 47. n. 151.

SOWERBY *Engl. Bot.* LXXX. t. 471.


WITHERING'S *Arrang.* II. p. 160.

Floret Julio. 24.

Radix perennis, fibrosa, caespitosa, fibris villosis,
fusca. *Culmus* sere tripedalis, erectus, strictus, simplex,
teres, glaber (rarius pubescens), ultra medium foliosus, geni-
culis circiter quatuor. *Folia* linear-lanceolata, acutiuscula,
striata, laete viridia, scabra; radicalia angustissima, pilis
longis sparsis adscendentibus ciliata, subinde involuta. *Va-
ginae* striatae, glabrae. *Stipula* brevissima, erosa. *Pani-
cula* erecta, ramis erectis, scabris, numero & longitudine
variis

BROMUS ERECTUS.

variis, simplicibus, rarius bisfloris. *Spiculae* lineari-oblongae, compressae, erectae, purpurascentes, vel glabrae vel tomentosae. *Glumae calycinae* lanceolatae, acutae, carinatae; interiore majore, trinervi. *Flosculi* 5 ad 9, imbricati, lanceolati, compresso-teretiusculi, subangulati, carinati, obsolete nervosi, carina scabri; aristis longitudine vix glumarum, parum infra apicem membranaceum exortis, rectis, scabris. *Glumae interiores* apicem versus minute pectinato-ciliatae, ciliis adscendentibus, minus quam in maxima parte Bromorum conspicuis. *Antherae* croceae. *Semen* lineari oblongum, supra fulcatum, apice villosum.





Sagina cerastoides. Dick.

SAGINA CERASTOIDES.

Mouse-ear. Pearl-wort.

Tetrandria Tetragynia.

CHAR. GEN. *Calyx* tetraphyllus; petala 4; *capsula* unilocularis quadrivalvis polysperma.

SAGINA *cerafloides* caule diffuso dichotomo, foliis spatulatis obovatis recurvis, pedunculis fructiferis reflexis. SMITH in *Linn. Transact.* II. p. 343—345.

LINN. *Sp. pl. cura Willd.* I. 2. p. 718.

Habitat in arenosis maritimis & fissuris rupium

Scotiae (in *Bodorriae insulis Incb Keitb & Incb Combe in the Firth of Forth, & on the beach below Prestonpans.*)

SMITH teste DICKSON qui novam stirpem primus inventit. V. *Linn. Trans.* l. c.

SOWERBY's *engl. Bot.* XL. n. 166.

Floret Iunio, Iulio. ♂?


Herba facie Cerastii, sed floribus semper quadrisidis.
Radix fibrosa, annua ut videtur. Caules plurimi diffusi
spitbamaei, teretes, foliosi; basi attenuati, glabriusculi, al-
ternatim ramosi; superne magis pubescentes, dichotomi,
geniculis tumidiusculis, pallidis, ramulis divaricatis. Fo-
lia opposita, patenti-recurva, integerrima, acuta, molia,
utrin-

SAGINA CERASTOIDES.

utrinque pubescentia; fubtus pallidiora atque nitidiora, venulis rectis, longitudinalibus; inferiora spatulata, longius petiolata; superiora obovata, sessilia; summa ovata. *Stipulae* nullae. *Flores* e dichotomia caulis, solitarii, primo subsessiles, statim pedunculati; *pedunculis* uncialibus, filiformibus, pubescentibus; fructiferis reflexis. *Calyx* e foliolis quatuor, parum patentibus, lanceolatis, acutis, concavis, basi obtuse carinatis, extus pubescentibus, intus lucidis; quorum duo opposita angustiora sunt, margineque membranacea. *Petala* quatuor, calyce fere duplo breviora, cuneiformis, alba, tenuissima, apice bifida, lobis acutis, rectis. *Stamina* quatuor, aequalia, petalis alternantia parumque breviora. *Filamenta* capillaria, alba. *Antherae* parvae, subrotundae, luteolae. *Germen* ovatum, longitudine staminum, pallide virescens, glabrum. *Styli* quatuor brevissimi, erecti. *Stigmata* recurva, villosa, alba. *Capsula* cylindrica, longitudine calycis, aureo nitens, apice dehiscens denticulis octo, triangularibus, obtusissimis. *Semina* numerosa, luteo-fusca, subcuneiformia, depressa, basi emarginata, margine scabriuscule.



Hyperugo procumbens. Lin.



ASPERUGO PROCUMBENS.

Liegender Scharfkraut. Rapette couchée.
Trailing Catch-weed.

Pentandria Monogynia.

CHAR. GEN. *Calyx* quinquesfidus laciiniis inaequalibus, peræcta florescentia compressus forma bivalvi. *Corolla* infundibuliformis, tubo recto brevissimo. *Pericarpia* quatuor ovata rugosa glabra.

ASPERUGO procumbens caulis diffusis angulosis: angulis aculeatis: foliis oppositis: superioribus secundis ovato-lanceolatis hispidis subpetiolatis: floribus axillaribus. MOENCH *Meth. pl. Marb.* p. 421.

A. procumbens LINN. *Sp. pl.* p. 198. *Fl. Lapp.* p. 48. n. 76. *Fl. Lapp. edit. SMITH.* p. 50. n. 76. *Fl. Suec.* p. 59. n. 166. *Hort. Cliff.* p. 44. *Syst. Veg. ed. XIV.* p. 183. S. N. ex edit. *Gmelin.* p. 321.

AITON *Hort. Kew.* I. p. 185.

SABBATI *Hort. Rom.* II. t. 25.

Buglossum sylvestre, caulis procumbentibus. c. BAUH. *Pin.* p. 257.

MORISON *Hist.* III. p. 439. f. II. t. 26. f. 13.

RAII *Hist.* I. p. 502.

Cynogloisa forte topiaria Plinio, sive Echium lappulatum quibusdam. I. BAUH. *Hist.* III. p. 599.

Habitat in ruderatis pinguibus

Helvetiae

HALL. *Hist. Stirp. Helv.* I. p. 269. n. 606.

Germaniae

ROTH *Tent. Fl. Germ.* I. p. 85. II, I. p. 217.

SCHRANK *Baj. Fl.* I. S. 445. n. 340.

SCHKUHR *Bot. Handb.* I. S. 103. n. 327. Tab. XXXI.

BAUMGARTEN *Fl. Lips.* p. 103. n. 298.

HOST *Syn. pl. Austr.* p. 92.

WIBEL *Fl. Werthem.* p. 175.



KROKER *Fl. Sils.* n. 288.

ASPERUGO PROCUMEENS.

Bohemiae

Fr. Wilib. SCHMIDT *Fl. Bohem.* Cent. III. p. 18.
n. CCXVII.

Hungariae

LUMNITZER *Fl. Poson.* p. 76. n. 188.

Galliae

GOUAN *Fl. Monsp.* p. 22.

VILLARS *Fl. Delphinat.* II. p. 461.

LAMARCK *Fl. Franç.* II. p. 279.

Italiae

SEGUIER *Pl. Veron.* I. p. 217.

ALLIONE *Fl. Pedem.* I. p. 50. n. 173.

Bern. ab UCRIA *Hort. Panorm.* p. 84.

Belgii

de GORTER *Fl. VII. Provinc.* p. 52. n. 176.

Daniae

Fl. Dan. t. 552.

O. Fr. MÜLLER *Fl. Fridrichsdal.* p. 38. n. 157.

Sueciae

LINN. *Fl. Suec.* I. c. *Fl. Lapp.* I. c.

RETZII *Prodr. Fl. Scand.* p. 54. n. 233.

LILIEBLAD'S *Utkast.* p. 80.

Norvegiae

GUNNER *Fl. Norveg.* II. p. 45. n. 508.

Angliae

RAII *Syn.* p. 228.

HUDS. *Fl. Angl.* p. 82.

RELHAN *Fl. Cantabr.* p. 79. n. 153.

WITHERING's *bot. Arrang.* 3d. Edit. II. p. 231.

Floret Mayo, Iunio. ♂.

Caules procumbentes, ramoso-dichotomi, angulati, aculeis hamatis parvis undique armati. Folia alterna, subfemide-currentia, ovali-lanceolata, obtusa, in petiolum attenuata, integerrima, supra scaberrima, infra minus scabra, utrinque obfuscure viridia. Flores axillares, solitarii, breviter pedunculati, parvi, caerulei. Calyx leviter hirtus; fructescens cernuus, compressus, palmato-dentatus, nervosus, scaber, nitidus.

Variat flore albo.



Rhododendron ponticum. L.

G. Kogel fcc. Hanby.



AZALEA PONTICA.

Pontische Azalca. Azalée pontique. Yellow Azalea.

Pentandria Monogynia.

CHAR. GEN. *Cor. campanulata. Stamina receptaculo inserta. Capsula 2-5 locularis polysperma.*

AZALEA *pontica* foliis nitidis lanceolatis, utrinque glabris, racemis terminalibus. LINN. *Sp. pl. App.* p. 1669. *Syst. Veg. ed. XIV.* p. 198. *S. Nat. ed. GMELIN.* p. 336. *Spec. pl. ex edit.* WILLDENOW I, 2. p. 830.

PETAGNA *inflitut. bot. II.* p. 343.

SCHREBER nov. *Act. Upf. I.* p. 90.

PALLAS *Fl. Ross.* II. p. 51. t. 69.

LAMARCK *Encycl. meth.* I, 1. p. 336.

Chamaerhododendros *pontica maxima, mespili folio,*
flore luteo. TOURNEFORT *Cor. 42.*

Act. Paris. 1704.

BUXBAUM *Cent. V.* p. 36. t. 69.

(*Aegolethron* PLIN.?)

Habitat


in **EURORA** prope fluvios *Danastrem* (*Dniester*) & *Bo-*
rysthenem (*Dnepr*), & ad littora septentrionalia *Pon-*
ti Euxini. Clar. HOVE invenit in terris *Comitis Sta-*
nislai Potocki, non longe distantibus ab oppido *Po-*
doliae, *Mohilow*; uti & ad *Ordesum* (*Oczakow*).

in **ASIA** frequens crescit in subalpinis *Caucasi*, tam
ad septentrionem, quam ad meridiem *jugi summi*,
praesertim in *fagetis* & *quercketis* ad fluvios *Terek*,
Uruch,

Uruch, Psechus, & transmontanos Aragi, Cfani, Liachvi & Rion seu Phafin. Crescit etiam in summo cacumine montis Beschtau, ad Cumae origines. Denique jam laudatus Dom. nove etiam ad Trapezantem, in littore meridionali Ponti Euxini vallem hac fructice vel totam repletam invenit.

Floret Majo. ᄁ.

Frutex saepius sesquicubitalis vel cubitalis, inordinate diffusus, subdichotomus, ligno flavescente, cortice cinereo laevi, ramis extremis apice partim foliatis, partim simul floriferis, infra nudis. Folia in summis ramis conferta, patentia, oblongo-ovata, acuta, rigidiuscula, subundulata, integra, pilis rigidulis ciliata, supra scabriuscula, infra laevia, nervofo-venosa, nec punctata, petiolo brevissimo ciliato insidentia. Flores in cymam terminalem congesti, 20 & plures, pedicellis erectis, pilosis, unifloris, longitudinem floris aequantibus. Perianthium quinque-partitum, brevissimum, persiflens, lacinis oblongis, pilosis. Corolla (maxima hujus generis) monopetala, semi-quinquefida, irregulariter infundibuliformis, dilute fulva; tubus longus, subincurvus, pentaedrus, pubescens; limbi laciniae ovato-acutae, margine reflexae, quatuor subaequales, quinta latior & basi introrsum alata. Stamina 5 immo tubo adhaerentia, subdeclinata, basi ultra medium hirsuta, longitudine corollae; antherae oblongae, didymae. Germen conicum, obsoletè pentagonum, superum, basi annulo prominulo cinetum; stylus filiformis, staminibus paucis longior; stigma capitatum. Capsula durescens, oblonga, pollicaris, acuta, subincurva, pentaedra, 5-locularis, 5-valvis, apice dehiscens, polysperma. Semina scrobiformia, grisea.



Gentiana verna. L.

GENTIANA VERA.

Frühlings-Enzian. Gentiane précoce. Spring Gentian.

Pentandria Digynia.

CHAR. GEN. *Calyx* monophyllus: *Corolla* monopetalis: utrisque persistentes; *Germen* stipitatum, basi tuberculis glandulosis tot, quot laciniae corollae, cinctum; *Stylus* nullus; *Capula* unilocularis, bivalvis, seminibus valvulis insertis.

GENTIANA verna corolla quinquefida infundibiliformi, foliis ovatis acutiusculis: radicalibus patentibus, caulinis majoribus. FROELICH de *Gentiana*. p. 65.

LINN. Sp. pl. I. p. 331. n. 10. S. Veg. ed. XIV. p. 268. n. 15. S. Nat. ex edit. GMEL. p. 461. n. 20.

LAMARCK Encycl. II. p. 632. n. 15. excl. Var. β .

SCHRANK naturhist. Briefe II. p. 192.

Gentiana bavarica. PALLAS Fl. ross. I. p. 110.

Gentianella dulcis. Conr. GESSNER in opp. cura SCHMIDEL II. p. 41. tab. XXII. f. 83: A. Excluso nom. Linn.

Gentiana alpina pumila verna major. TOURNEF. inst. p. 80.

BARREL. obs. IV. n. 25. ic. 98. 109. f. 1.

Gentianella alpina verna major. C. BAUHINI pin. p. 188.

Habitat in alpibus, montibus & pratis humidis

Hel-

GENTIANA VERRNA.

Helvetiae

HALL. *Hist. stirp. Helvet.* I. p. 286. n. 644. emend.
IV. n. 217.

Germaniae

ROTH *Tent. fl. germ.* I. p. 112. II. 1. p. 286.

SCHRANK *Bay. Fl.* I. p. 513. n. 429. *Fl. Salisb.*
p. 80. n. 252.

Gentiana terglovensis HACQUET *alp.* p. 9. n. 4. tab.
II. fig. 3.

HOFFMANN *Fl. Germ.* p. 87.

HOST *Synops. pl. austri.* p. 133. n. 9.

†

SCOPOLI *Fl. carn.* edit. 1. p. 299. n. 8. ed. 2. I. p.
178. n. 291.

Bohemiae

SCHMIDT *Fl. Bohem.* Cent. II. p. 19. n. CXVIII.

Angliae

HOW *Phytologia* (1650.) p. 46.

MERR. *Fin.* p. 45.

Gentianella alpina verna. CER. em. 436. f. 2.

- SOWERBY's *Engl. Bot.* LXXXII. n. 493.

Italiae

ALLIONE *Fl. Pedem.* I. p. 98. n. 356.

Galliae

VILLARS *Fl. Delphinat.* II. p. 526. n. 9.

LAMARCK *Fl. frang.* II. p. 294. (*G. ferrata.*)

Floret Martio, Aprili, Mayo. 2.

Radix filiformis, obliqua, subfibrosa multiceps fusco
flavescens praelonga. *Caulis* erectus filiformis angulatus,
modo

modo brevissimus fere nullus, modo biuncialis s. digitalis. *Folia* ovata s. ovato-lanceolata acutiuscula subtrinervia margine (ad lentem) tenuissimo albo cincta; *radicalia* conferta terrae incumbentia in rosulam congesta, caulinis multo majora, tres ad quatuor lineas lata, quinque ad octo lineas longa; *caulina* 2-3 parium, ovata, magis acuta, basi coadunata carinata; duas lineas fere lata, tres ad quatuor longa. *Flos* terminalis, supremo foliorum pari involucratus, similis GENTIANAE bavaricae, at major. *Calyx* tubulosus alis quinque protuberantibus angulatus, viridi caerulef-cens, quinquesfidus: laciniis lanceolatis acutis. *Corolla* saturate caerulea, limbo quinquefido: laciniis magnis ovatis obtusis, modo integerrimis modo argute serratis; dentibus interjectis minutis argute bifidis concoloribus medio linea albida divisis. *Stamina* tubo breviora; *antherae* distinctae. *Pistillum* tubum aequans; *germen* supra attenuatum velut in *stylos* duo elongatum; *stigmata* duo contigua semicircularia alba, margine fimbriata, horizontaliter expansa, faucem corollae claudentia, demum reflexa. *Capsula* oblonga fusiformis, breviter pedicellata. *Se-mina* oblonga, utrinque attenuata rugosa minuta.


OBS. Hanc botanici plures pro GENTIANA bavarica L. perperam habuerunt, seducti notis specificis a b. LINNÆO doctis, corolla scilicet ferrata, quae utrique speciei communis esse folet. Planta ex solo natali, florendi tempore aliisque caussis maxime proteiformis. *Caulis* iis, quae primo vere florent, aut in collibus siccis apricis crescunt, fere nullus; illis vero, quae ferius florent aut adolescunt, quae-

ve in pratis herbosis uidis aut in alpibus pinguibus graminosis proveniunt, ad digitii longitudinem exsurgit, foliis pro caulis proceritate saepe remotissimis. Foliorum quoque magna varietas est; ea enim modo ovato-lanceolata, modo ovata, obtusifuscula, ut in sibirica varietate (*G. uniflora* GEORGI iter I. p. 203. T. I. f. 2. c. descr.), immo retusa; caulina modo ovata, modo lanceolata acuta obseruantur; at folia radicalia constanter caulinis & latiora & longiora, nullo modo erecta, sed terae adpressa sibi incumbentia, constanter magis acuta, praesertim caulina, quam in *GENTIANA bavarica* L., quibus notis facilime ab adfinibus dignoscitur. Corollae limbus modo integerrimus, modo ferratus. Specimina caule brevissimo lacinias argutius ferratas habere solent.

Huc quoque pertinere videtur *GENTIANA* corolla quinquefida infundibiliformi, caule unifloro, foliis lanceolatis imbricatis MAYER act. boh. anni 1785. p. 46. *HIPPION imbricatum* SCHMIDT Fl. Boh. II. p. 18. n. 117. Varietas insignis flore luteo. Frölich.



Ruta patarina L.



RUTA PATAVINA.

Padua's Raute.

Decandria Monogynia.

CHAR. GEN. *Calyx* quinque-partitus. *Petala* con-cava. *Receptaculum* punctis melliferis decem cinctum. *Capsula* lobata.

RUTA patavina foliis ternatis sessilibus. LINN. *Sp. pl.* I. p. 549. *Syst. Veg.* ed. XIV. p. 398. S. N. edit. GMELIN. p. 676.

PETAGNA *inf.* bot. III. p. 758.

VITTMANN *summa plant.* III. p. 31.

Pseudoruta patavina, trifolia, floribus luteis, umbel-latis. MICHELI *gen.* p. 22. tab. 19. *Catal. plant. Horti Florentini.* p. 76.

Habitat in Monte Saxo Nigro, prope Arcuatum, s. Ar-qua, non longe Patavio. Floret Julio & Au-gusto. 24.


Petala plana, integro.

Plantam rarissimam & botanicorum paucissimis cognitam in Hortulo colui, sed infelici fato perdidi antequam semina matura perfecisset. Interim primam, quod scio, hujus speciei iconem coloribus fucatam sisto, uberiorem ejus descriptionem ad illud tempus reservans, quo mihi attentius eandem observeare licebit. Semina nempe matu-ra e loco natali accepta spem alunt, hoc mihi aestate pro-xima possibile fore.





Silene pendula L. *biased* *fr*



SILENE PENDULA.

Hängende Silene. Pendulous Catchfly.

Decandria Trigynia.

CHAR. GEN. *Calyx* ventricosus. *Petala* 5 unguiculata, coronata ad faucem. *Capula* 3-locularis.

SILENE *pendula* calycibus fructiferis pendulis inflatis: angulis decem scabris. LINN. *Sp. pl.* p. 599. *Hort. upf.* p. 109. *Syst. Veg.* ed. XIV. p. 421. n. 22. S. N. ex edit. GMEL. p. 716.

PETAGNA *inf. bot.* III. p. 813.

VITTMANN *summa plant.* III. p. 95.

AIT. *Hort. Kew.* II. p. 96. n. 12.


Viscago *hirsuta* sicula, lychnidis aquaticeae facie, supina. DILL. *Hort. Elth.* p. 421. t. 312. f. 404.

Cucubalus *floribus trigynis erectis, fructibus pendulis, calycibus striis decem crispis.* LINN. *Hort. Cliff.* p. 170.

Cucubalus *floribus trigynis erectis, calycibus fructus pendulis angulosis.* LINN. *Hort. Cliff.* 171.

Habitat in Sicilia & Creta. In Hortis floret Iunio & Iulio, seminibus faciliter propaganda. ◎.

Caules plures semipedales & ultra, supini, pilosi. Folia subhirsuta, oblongo-lanceolata, sessilia, radicalia conferta, caulina opposito. Petala dilute purpurascens.



CONTENTA FASCICULI SEXTI.

Festuca duriuscula. LINN.

Bromus erectus. SMITH.

Sagina cerastoides. DICK\$.

Asperugo procumbens. LINN.

Azalea pontica. LINN.

Gentiana verna. LINN.

Ruta patavina. LINN.

Silene pendula. LINN.



FLORA EUROPAEA

INCHOATA

A

JOH. JAC. ROEMER

MED. ET CHIR. DOCT.

EORVNDEMQUE IN INSTITVTO MEDICO - CHI-
RVNGICO QVOD TVRICI FLORET,
PROFESSORE.


SOCIETATIS MED. ET CHIR. PER HELVETIAM CORRE-
SPONDENTIVM E MEMBRIS PRAESIDI ADIVNCTIS. SOC.
PHYSICAE TVRICENS. MEMBR. ORDINARIO. ACAD. REG.
SCIENT. STOCKHOLMIENS. NATVRAE SCRVTATOR. BERO-
LINENS. HALLENS. ET IENENS. AGRARIAE VICENTINAE,
PRIVATAE GOETTINGENS. MEMERO HONO-
RARIO.



FASCICVLVS VII.

NORIMBERGAE

EX OFFICINA RASPEANA
1801.



PLURIMUM REVERENDO

F R A N C. X A V. L. B.

D E W U L F E N.


SEPTIMUM

FLORAE EUROPAEAE FASCICULUM

QUA PAR EST OBSERVANTIA


D. D. D.

I. I. R O E M E R.





Campanula mollis.



CAMPANULA MOLLIS.

Weiche Glockenblume. Soft Bell-flower.

Pentandria Monogynia.

CHAR. GEN. *Corolla campanulata. Stamina quinque*, basi latiori conniventia. *Stigma 3-5 fidum. Capsula infera*, trigona, evalvis, trilocularis, foraminibus lateralibus dehiscens.

** *Foliis scabris.*

CAMPANULA *mollis* capsulis quinquelocularibus pedunculatis, caule prostrato, foliis suborbiculatis. LINN. *Syst. Veg. edit. XIV.* p. 209. *Syst. Nat. ex edit. GMEL.* p. 351.

Viola mariana minor caerulea, folio subrotundo, calyce corniculato. BARR. *it.* p. 759.

Campanula rotundifolia hirsuta faxatilis folio molli. BOCC. *sic. p. 83.*

C. *dichotoma* β. LAMARCK *Enc. I, 2.* p. 579. n. 43.

Habitat in Sicilia, Hispania. Seminibus in tepidario facile propagatur. ◎.

Caules decumbentes, subramosi, rigidiusculi, villosi. Folia parva, sessilia, suborbiculata, subintegerrima, tomentosa, pubescentia. Flores ex alis foliorum, solitarii, longius pedunculati. Calyces magni, nudi, sinibus reflexis. Verbo: Herba Antirrhini mollis, Flores Campanulac Melli, ceterum statura Campanulae heterophyllae. LINN. in *Sp. pl.*





*Bupleurum
graminifolium.*



BUPLEURUM GRAMINI-FOLIUM.

Grasblättriger Durchwachs.

Pentandria Digynia.

CHAR. GEN. *Involucrum partiale quinquephyllum: foliolis patentibus ovatis acutis; petala involuta lutea: fructus ovato-oblongus, striatus compressus bipartibilis.*

BUPLEURUM *graminifolium* involucellis heptaphyllis, universali subtriphylo, foliis radicalibus linearibus, scapis monophyllis. VARL Symb. III. p. 48.

Perfoliata alpina gramineo folio, f. *Bupleuron angustifolium alpinum*. C. BAUH. pin. p. 277.

Habitat in fissuris rupium alpium

Helvetiae

HALL. Hist. Stirp. Helv. I. p. 344. n. 773. β .

Germaniae

WULFEN in IACQ. Collect. Tom. I. p. 209. B. *petraeum* scapo umbellaque terminali simplissimo, involucellis polyphyllis, universali pentaphyllo, foliis radicalibus gramineo-caryophylleis.

IACQ. Ic. rar. I. tab. 56.

HOST Syn. pl. Austr. p. 139.

Galliae

Galliae

B. *petraeum* involucellis lanceolatis heptaphyllis, universali triphylio, caule bifloro. VILLARS *Fl. Delphinat.* II. p. 576. t. 14.

Italiae

Sedo petreio con foglia di Bupleoro. PONA monte Baldo (4°. Venet. 1617.) p. 246.

B. *alpinum*, foliis angustis gramineis sessilibus, caule fere nudo. SEGUIER Veron. II. p. 15. III. p. 221.

B. *petraeum* caule nudo, foliis gramineis, involucro & involucellis distinctis polyphyllis. ALLIONII *Auct.* p. 24.

(Cf. B. *incurvum* BELLARDI in *Mem. de Turin* Vol. V. p. 223. Tab. IV. USTERI *Annal. d. Bot.* XV. p. 57.)

Floret Julio, Augusto. 24.

Radix perennis, simplex, 3-4 lineas crassa, teres, fusca, odore Dauci Carotae, jam e terra emersura in plures divisa ramulos, multiceps, totidem foliorum radicallium caespites stipatissimos effert, glomeri insidentes hemisphaerico, ex residuis imbricatisque tabidorum superiorum annorum foliorum exuvias composito. *Folia* ipsa annua plurima, sub obtuso velut arcu, erecto-patentia, linear-lanceolata, scapo non multum breviora, laete virentia, glabra, laeviaque, superne primum canaliculata, & scapo basi obvoluta, subtus rachi media teretiuscula elevata, demum planiuscula, ac vere gramineo-caryophyllaea. *Scapus* vix spithamam attingens, e radice, medius inter folia,

folia, recte adscendens, viridi plus minus rubescens, teres, laevis, aphyllus, rarissime folio uno ovato-lanceolato sessili amplexicauli instructis. *Umbella* universalis unica, terminalis, radiorum inaequalium ex viridi plus minus rubentium quinque, involucro pariter pentaphyllo excepta; foliolis lanceolatis, inaequalibus, erecto-patentibus. *Umbellulae partiales* involucellis polyphyllis, in stellam patentibus, foliolis luteolo-viridibus, planis, striatis, ovato-acutis, nupsiam connatis, rarius quinis tantum, plerumque sex, septem, octove, aut & novem, flosculos tantillum excedentibus. *Flosculi* copiosi, singuli breviter pedunculati, altitudine, ut involucelli foliola inter se, aequales. *Petala* quinque aequalia, e viridi flava, integra, ovato-acuta, acumine sursum reflexo, germen alternatim cum calyculi denticulis coronantia. *Stamina* quinque, una cum antheris, & stylis binis divergentibus, flava. *Semen* inferum, ovatum, glabrum, striatum, bipartibile, ex rufo-fuscum.

OBS. Iam dudum in prodromo p. 129. monuit c. BAUHINUS, quod non confundi debet *Perfoliata alpina angustifolia* cum *Bupleuro angustifolio alpino*, quod in Baldo occurrit. Nihilo minus illustr. a LINNE in *Spec. plant.* p. 341. *Sedum petraeum* *Bupleuri folio PONAE* ad saum *Bupleurum petraeum* revocat. Erronea hac citatione seducti, omnes plantam a Linnaei diversissimam pro *B. petraeo* ejusdem habuerunt. Hinc non mirum, quod omnes quoque in descriptione involucrorum & involucellorum *B. petraei* Linnaeo disperant. Gaudet quidem *BUPLEURUM petraeum* Linnaei, uti *TEDUM petraeum* Ponae foliis radicalibus linearibus,

bus, sub ramificationibus vero ovato-lanceolatis
amplexicaulibus, non vero unico in scapo, caete-
rum aphylo, ut in *S. petraeo* Ponae. Linnaei
praeterea a *B. petraeo* aliorum autorum differt:
involucellis ovatis pentaphyllis, floribus longiori-
bus, nec heptaphyllis linearibus, umbellula brevio-
ribus. Habitus denique omnino diversus. Num
B. petraeum & *ranunculoides* una eademque plan-
ta sint, uti suspicatus est GOUAN in *Illustr. Bot.*
p. 8., nondum satis liquet.



Tulipa *sylvestris*.



TULIPA SYLVESTRIS.

Wilde Tulpe. Tulipe sauvage. Wild Tulip.
Hexandria Monogynia.

CHAR. GEN. *Corolla hexapetala, campanulata. Sty-*
lus nullus. Capsula supera, trilocularis. Se-
mina plana.

TULIPA *sylvestris* flore subnutante, foliis lanceolatis.
LINN. *Sp. pl.* p. 438. *Syst. Nat. Ed. XIV.* p.
325. *S. Veget. edit.* GMEL. p. 547.

T. caule unifloro glabro, flore subnutante, petalis
acutis apice barbatis, foliis lanceolatis. LINN.
Sp. pl. ex edit. WILLDEN. p. 96.

Tulipa minor lutea gallica. c. BAUH. *Pin.* p. 63.

Tulipa narbonensis CLUS. *Hist.* p. 151.

Lilionarcissus narbonensis montanus & parva Tulipa
dodonaei LOB. *Hist.* p. 63. *adv.* 51. *ic.* 124.

T. sylvestris GOUAN *Illustr.* p. 25.

PALLAS *Itin.* III. p. 562.

KNIPHOF *Cent.* VIII. n. 96.

AITON *Hort. Kew.* I. p. 435.

Habitat in pomariis & sylvaticis

Helvetiae?

HALL. *Hist. Stirp. Helv.* II. p. 115. n. 1236.

Germaniae?

ROTH *Tent. Fl. Germ.* I. p. 152. II, 1. p. 397.

SCHRANK *Bai. Fl.* I. S. 595. n. 531.

BAUMGARTEN *Fl. Lips.* p. 191. n. 495.

SCHKUHR *Bot. Handb.* I. S. 282. n. 853.

MOENCH *method. plant.* *Marb.* p. 301.

HOST *Synops. plant.* *Auflr.* p. 188.

Galliae

GOUAN *Fl. Monspeliens.* p. 309.

VILLARS *Fl. Delphinat.* II. p. 248.

LAMARCK *Fl. frang.* III. p. 299.

Italiae

ALLIONE *Fl. Pedem.* II. p. 161. n. 1891.

PETAGNA *Instit. Bot.* III. p. 615.

ab UCRIA *Hort. Panorm.* p. 154.

Bo-

Bohemiae

SCHMIDT *Fl. Bohem. Cent.* III. p. 37. n. CCCXXXV.

Daniae?

Fl. Dan. tab. 375.

Sueciae?

LINN. *Fl. Suec.* ed. 2. p. 106. n. 284.

LILIEBLAD's *Utkast.* p. 119.

RETZII *Prodr. Fl. Scand.* Ed. 2. p. 77.

Angliae?

SOWERBY'S *Engl. Bot.* XXI. n. 63.

WITHERING'S *Arrang.* II. p. 336.

Floret Aprili & Majo. 24.

Bulbus simplex, solidus, mucilaginosus, membranis fuscis aridis vestitus. Scapus erectus, simplicissimus, teres, succulentus, uniflorus, glaber, versus apicem semper inflexus (quod non in T. gesneriana). Folia lanceolata, angusta, acuminata, sessilia, amplexicaulia, caulem quasi vaginantia, crassa, carnosa, avenia, glauco-viridia, glaberrima. Corolla nutans, flava, acuta: petala lanceolata, utrinque attenuata, concava, carnosa, apicibus acutis subcallosis, extus villosis, basi villis albis margine & intus hirsuta: tria exteriora dorso carinata, virentia; interiora tria paulo angustiora, laevia. Stamina subulata, flava, apice filiformia, basi valde attenuata, depressa supra basin ubi incrassantur, circum circa pilis albis barbata, Antherae oblongae, erectae, obtusae, flavae, Polline flavo. Germen antheris brevius, trigonum. Stigma obtusum, non compressum aut dilatatum.


OBS. 1. *Variat caule bifloro, petalis & staminibus septem & octo.*

2. *Bulbi cocti, cum oleo & pipere adsumti, sapidi & salutares sunt.* PARKINSON.



Daphne collina.

Vogel fec:



DAPHNE . COLLINA.

Napolitanischer Seidelbast. Neapolitan
Mezereon.

Octandria Monogynia.

** *Flores incompleti.*

CHAR. GEN. *Calyx quadrifidus, corollinus, marcel-*
cens, stamina includens. Bacca monosperma.

†† *Floribus terminalibus.*

DAPHNE *collina* floribus terminalibus sessilibus, foliis-
obovatis obtusis, superne glaberrimis, inferne
pilosis. SMITH Spicil. Fasc. 2. p. 16. t. 18.

D. *collina* DICKSON dried Plants II, n. 34. LINN.
Sp. pl. ex edit. WILLDEN. II, I. p. 423. n.
30. excluso Synonymo Vahliano.

D. *oleaefolia* floribus fasciculatis sessilibus, termina-
libus, foliis lanceolato-oblongis subtus vil-
losis. LAMARCK Enc. meth. III. p. 424.
n. 22.

D. *sericea* VAHL Symb. Bot. I. p. 28?

Daphnoides aliud rarum foliis supinis hirsutis. GESN.
Fasc. p. 6. t. III. f. 7. exclusis Synonymis
Halleri, Linnaei, Plukenetii, & forte Barre-
lieri.

Thymelaea faxatilis Oleae folio. TOURNEF. Inst. p.
594.

Chamelaea alpina, folio inferne incano. c. BAUH.
Pin. p. 462.


Cha-

Chamelaea incana & lanuginosa I. BAUH. *Hist.* I. p.
586.

Chamelaea alpina incana. LOB. *Icon.* p. 370.

Habitat in collibus Italiae australis. Prope Casertam ad ripas Vulturni mense Martii 1787 legit Cel. SMITH. In tepidariis nostris laete viret florens a Ianuario ad Aprilim usque. ḥ.

Frutex pulcherrimus, "vadosi accola Vulturni,, , colles camposque in confiniis ejus tegit , flosculos suos fragrantissimos undique carpentes offerens. Caulis tripedalis, ramosissimus, ramis saepe dichotomis. Cortex tenax, rugosus, glaber, in ramulis junioribus villosus. Folia alterna, breviter petiolata, obovata, obtusa , integerrima, margine parum revoluta ; supra glaberrima, nitida ; subtus sericeo-villosa ; semper virentia. Flores in Capitulis terminalibus, sessiles, numerosi. Bracteae obovatae, obtusae, extus villosae. Calyx ruber, extus sericeo-albus, lacinias patentibus, obtusiusculis. Stigma capitatum. Germen setis erectis obvestitum, glandulis insidens nectari-feris.



Phlomis purpurea -



PHLOMIS PURPUREA.

Purpurröthliche Phlomis. Purple Phlomis.

Didynamia Gymnospermia.

† Calyces subquinquefidi.

CHAR. GEN. *Calyx* angulatus. *Corollae labium superius* incumbens, compressum, villosum.

PHLOMIS *purpurea* bracteis lanceolatis acutis pungentibus, calycibus pentagonis acuminatis, foliis subtus densius lanatis. SMITH *Spic. Bot. Fasc. I.* p. 6.

P. *purpurea* LINN. *Sp. Pl. Ed. I.* p. 585. (exclusis Synonymis praeter Tournef.) *Syst. Nat. ed. IO.* p. 1101.

P. *fruticosa* lusitanica, flore purpurascente, foliis acutioribus. TOURNEF. *Inst. p. 178.*

BARRELLIER p. 23. *Ic. 405.*

Habitat in Regni Valentini deserto Murrhenzi. BARRELLIER. *Iunio floret. 24.*

Caulis suffruticosus, erectus, ramosus, obsolete quadrangulus, dense lanatus, praecipue ramuli juniores. *Folia* opposita, ovato-oblonga, obtusa, crenata, reticulato-venosa, utrinque lanata, subtus vero densissime; *inferiora* basi retusa, nec cordata, longius petiolata; *superiora* brevius. *Petiolae* canaliculati, densissime lanata. *Lana* totius plantae stellata est, ut in congeneribus aliisque. *Stipulae* nullae. *Verticilli* sessiles in axillis foliorum superiorum, 6 - ad 8 - flori. *Bracteae* plurimae, longitudine calycum, subimbricatae, lanceolatae, acuminato-pungentes, rigidae, concavae, trinerviae, extus lanatae, intus glabrae. *Flores* sessiles, magnitudine Phl. fruticosae, dilute purpurascentes. *Calyx* aequalis, quinquangularis, parum ventricosus, margine quinquefidus, laciniis mucronato-pungentibus, erectis; extus tomentosus, angulis fauceque pilosus.

Co-

Corolla calyce duplo longior: tubus medio constrictus; labium superius magnum, tomentosum, ore pilosum; inferius duplo fere longius, dependens, pallidius, venosum, quinquelobum; lobi exteiiores acuti; medii obtusi, minimi; impar maximus, apice emarginatus. Stamina tubo corollae inserta, labio superiori inclusa, simplicia, incurva, quorum duo superiora vix longiora. Antherae incumbentes, subcampanulatae, uniloculares, fuscae. Germen parvum, tetracoccum. Stylus filiformis, incurvus, staminibus paulo longior. Stigma acutum, obsolete bifidum. Semina prismatica, apice punctata, fusca. Herbae odor saponaceus, ut in Phl. fruticosa.

OBS. Haec est vera *Phlomis purpurea* a Linnaeo in *Sp. pl. ed. 1.* inserta, sed postea in ejusdem operis editione secunda cum alia specie confusa, cuius Synonyma & Characteres cel. I. E. SMITH ita proponit:

PHLOMIS ITALICA.

LINN. *Syst. Nat. ed. 10.* p. 1102.

PHLOMIS bracteis lanceolatis obtusis inermibus, **calycibus** truncatis muticis, foliis utrinque lanatis.

P. purpurea LINN. *Sp. Pl. ed. 2.* p. 818. c. descriptione.

P. fruticosa, flore purpureo, foliis rotundioribus.
TOURNEF. *Inst. p. 178.*

Verbascum subrotundo Salviae folio c. BAUH. *Pin. p. 240.*


PLUKN. *Phyt. t. 57. f. 6.* ubi forma calycis bene depingitur.

Habitat in Italia & Lusitania. In Hortis frequens. 4.

Folia subtus venis minus conspicuis quam in vera P. purpurea, utrinque fere aequaliter lanata, nec supra viridia; inferiora basi cordata. Bracteae obtusae, minime pangentes, calycibus obtusissimis dimidio breviores. SMITH.



Arabis orizensis



ARABIS OVIRENSIS.

Tetradynamia Siliquosa.

CHAR. GEN. *Glandulae nectariferae* 4; *singulae intra calycis foliola squamae instar reflexae; siliqua linearis apice integra capitata.*

ARABIS ovirensis foliis simplicibus, integris, repando-denticulatis, petiolatis; caulinis oblongis subovatis; radicalibus orbiculatis. Cel. WULFEN in IACQ. Collect. I. p. 196, 197.

Per bellam plantam, nulli adhuc auctorum visam, nec cognitam, cum Ovirenses supra Ebriacum in Valle Iunonia percurreret alpes, sub initium Iulii locis petrofis calcareis, haud procul a Sternfeldianis plumbi fodinis satis invenit frequentem cel. WULFEN. 24.

Radix sordide ex albo subflavescens, gracilis, teres, nuda, farmentis longe lateque sub terra diffusis repens, laxe per intervalla nodoso-geniculata, & multiceps; densaque fibrillarum pene capillarium coma ad geniculorum nodulos solo illigata simul & caulifera. Caulis simplex, erectus, gracilis, teres, nudus, sex septemve pollices altus, viridis, foliis rariter, per alterna velut intervalla, sparsis obsitus, oblongo-subovatis, planis, integris, margine repando-denticulatis, utrinque nudis, (praeter summa sessilia) petiolatis, laete virentibus. Folia radicalia plurima, caulinis caetera simillima, minora tamen, at longiore instructa petiolo, orbiculata potius quam ovata, margine rariter

rariter denticulato. *Flores* per summum caulem nec stipe admodum conferti, nec immodice copiosi; singuli proprio suo linearum aliquot pedunculo, absque bracteola, insistentes. *Calyx* tetraphyllus, foliolis ovato-oblongis, concavis, nudis, integerrimis, ex viridi flaventibus, corolla duplo brevioribus, erecto-patentibus. *Corolla* tetrapetala dilute rubella, aut & alba; petalis obovatis, integris, in unguem album, calycis longitudine decurrentibus, limbo patente, dilute rubello, aut & quandoque albo. *Stamina* sex tetrodynamata, calycis longitudine, subulata, alba, antheris luteis. *Germen* oblongum, teretiusculum; stylo brevi, stigmate truncato. *Siliqua* linearis, torulosa, bilocularis, bivalvis; valvulis dissepimento parallelis, deciduis absque revolutione. *Semina* multa. WULFEN l.c.



Hippocrepis balearica

Vogel fec.



HIPPOCREPIS BALEARICA.

Staudenartiges Hufeisen. Shrubby Horse-Shoe
Vetch.

Diadelphia Decandria.

CHAR. GEN. *Pericarpium* multiloculare, compressum,
altera futura plures emarginatum, curvum.

HIPPOCREPIS *balearica* leguminibus pedunculatis confer-
tis subarcuatis, lanceolato - oblongis, margine
exteriore repandis. LINN. *Syst. Veget. edit.*
XIV. p. 671. *Syst. Nat. ex edit.* GMEL. p.
1119.

JACQUIN *Misc. II.* p. 305.

Icon. pl. rar. Cent. I. tab. 5.

H. balearica leguminibus pedunculatis confertis gla-
bris, margine exteriore lobatis, foliis caly-
cibusque pilosiusculis, caulis ancpitibus.
AIT. *Hort. Kew. III.* p. 61.

*Habitat in insula Minorca. Hospitatur in tepidariis
nostris, Majo & Iunio florens. Seminibus optime
propagatur.* ḥ.


Radix in truncum exit brevem, lignosum, digitis cras-
sitie, emittem ramos adscendentes, vel magis procum-
bentes, inferne fruticosos & perennantes. *Folia* sunt
pinnata, glabra; foliolis utrinque fere acto, cum terminan-
te impari, oblongis, integerrimis, obtusis cum mucrone
vix conspicuo, sessilibus. *Pedunculi*, teretes, substriati,
glabri,

glabri, & longi, terminantur in *umbellam* multifloram, qualem Hippocrepis comosa habet. *Flores* leniter suaveolentes. *Calyx* pallide viret, laxus, & ad dimidias bilabiatus: labio superiore recto & semibifido, inferiore ex dentibus tribus, duobus lateralibus & dscendentibus, omnibus acuminatis & ferme ejusdem altitudinis. *Corolla* luteolae. *Vexillum* rotundatum, integerrimum, striatum, ad angulum rectum ex longo & canaliculato ungue adscendens, cum oris tandem revolutis. *Alae* obverse ovatae, obtusissimae, ampliae, fere longitudine vexilli. *Carina* pallidius colorata, falcata, alis brevior, adscendens, acuminata, cum ungue bicipite gracillimo. *Filamenta* decem, diadelpha, pallida, longitudine & situ carinae. *Antherae* flavae. *Germen* lineare, rectum, compressum, viride, longum. *Stylus* capillaris, albidos, ad angulum rectum ex germine adscendens. *Stigma* simplex. *Legumen* oblongum, obtusum, rectiusculum, vel parum incurvatum, sutura superiore semel aut bis terve sinuata, glabrum & fuscescens. *Semina* nitida, fusca, teretia, arcuata, obtusa,



Hypericum dubium.

G. Vogel sc. Nurnbg:



HYPERICUM DUBIUM.

Undurchlöchertes St. Iohannis - Kraut. Imperforate St. John's Wort.

Polyadelphia Polyandria.

CHAR. GEN. *Calyx* quinquephyllus. *Corolla* pentapetala. *Capula* pyramidata trivalvis. Disseminationa duplicata ex inflexis valvularum marginibus: loculis polyspermis.

** *Trigyna.*

HYPERICUM *dubium* floribus trigynis, caule subquadra-to herbaceo, foliis ovatis, calycibus obtusissimis.

LEERS *Fl. Herbornens.* p. 169. n. 594.

Habitat ad vias & sepes

Germaniae

LEERS l. c.

WILDENOW *Prodr. pl. Berol.* p. 246. n. 759.

ELWERT *Fl. Marggrav. Baruth.* p. 18.

H. quadrangulum POLLICH *palat.* II. p. 356. n. 716.

H. fallax floribus trigynis, foliis ovato-oblongis rugosis calycisque laciniis ovatis obtusis, caule subquadrangulo. GRIMM. Isenac. in *Nov. Act. A. N. C.* Vol. III. Append. 362.

H. dubium ROTH *Tent. Fl. Germ.* I. p. 325. II, 2.
p. 230.

HOFFMANN *Fl. Germ.* p. 270.

MOENCH *Method. pl. Marburg.* p. 129. (*H. obtusum.*)

HOST

HOST *Synops. pl. Austr.* p. 419.

WIBEL *Fl. Werthem.* p. 258.

Galliae

H. *Delphinense* VILLARS *Fl. Delphinat.* III. p. 497.

Angliae

SOWERBY *Engl. Bot.* LXII. n. 296.

WITHERING's *Arr.* 3d. Edit. III, 664.

Floret Julio & Augusto. 2f.

Caules plures 2 f. 3 pedales, eretti, subquadrangulares, punctis nigris adspersi. *Folia* amplexicaulia, ovata, margine acutissimo scarioso subtus nigro-punctato, apice subretusa cum acumine brevi. *Flores* maiores quam in H. *perforato* & *montano*, subcorymbosi, saepius terni, pedunculati. *Calyx* pentaphyllus, foliolis distinctis, ovatis, integerrimis, flavo-viridibus, lineolis interruptis atris undique notatis. *Petala* magna, integerrima, supra lineolis, subtus margine punctis atris raris notata. *Staminum* phalanges tres, longitudine Corollae. *Capsula* ventricosa, triangularis, calyce reflexo ad basin cincta.

Differt itaque ab H. *quadrangulari* 1. *Caule* bi- seu tri-pedali subquadrangulo, punctis nigris adsperso. 2. *Foliis* majoribus, amplexicaulibus. 3. *Calycis* foliolis ellipticis, obtusissimis. 4. *Capsulis* ventricosis, triangularibus, nec ovato-cylindricis. Ab H. *perforato* differt: defectu punctorum pellucidorum in foliis & calycis foliolis ellipticis obtusis.

CONTENTA FASCICULI SEPTIMI.

Campanula mollis LINN.

Bupleurum graminifolium VAHL.

Tulipa sylvestris LINN.


Daphne collina SMITH.

Phlomis purpurea SMITH.

Arabis ovirensis WULFEN.

Hippocrepis balearica LINN.

Hypericum dubium LEERS.







New York Botanical Garden Library



3 5185 00221 8905

